



# 2018

## REFERENTIEL N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O

MODALITES DE RAISONNEMENT DES DOSES  
PREVISIONNELLES EN N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O POUR LES  
BOUES ET COMPOSTS DE BOUES URBAINES

### CAHIER CULTURE MAÏS



## Remerciements - Contributeurs

---

La réalisation de ce référentiel a été soutenue financièrement par les Agences de l'Eau Rhône Méditerranée Corse et Adour Garonne, les Chambres d'agriculture de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de Lozère et des Pyrénées-Orientales et les Conseils Départementaux de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de Lozère et des Pyrénées-Orientales.

### Liste des membres du réseau des MESE d'Occitanie ayant participé à la rédaction de ce cahier :

Stéphanie RUBIO	MESE de l'Aude
Claire GAFFIER	MESE du Gard
Laure-Hélène PONS	MESE du Gard
Marie CASTAGNET	MESE de l'Hérault
Laure GOMITA	MESE de la Lozère
Mélanie MASSEBEUF	MESE de la Lozère
Margot DALLA-NORA	MESE des Pyrénées-Orientales
Laurence SIRJEAN	MESE des Pyrénées-Orientales

### Remerciements à :

Gilles BOYER	Chambre d'agriculture de l'Aude
Gilles TERRES	Chambre d'agriculture de l'Aude
Thierry PIANETTI	Chambre d'agriculture du Gard
Alain ALLIES	Chambre d'agriculture de l'Hérault

## Edito

### La Mission d'Expertise et de Suivi des Épandages, Qu'est-ce que c'est ?

Il s'agit d'une mission d'assistance technique au service de l'État, des Agences de l'Eau, des maîtres d'ouvrage des stations d'épuration et des exploitants agricoles, visant à favoriser l'organisation de filières de valorisation agronomique des boues conformes à la réglementation et qui préservent les intérêts de l'agriculture et de l'environnement. Avec l'appui des Agences de l'Eau, **la MESE joue le rôle d'organisme de suivi indépendant des producteurs de boues.**

Elle a pour principal objectif d'encadrer les pratiques d'épandages afin de contribuer à la **préservation de la qualité des sols, des cultures, des produits et de l'environnement.** Les trois fonctions essentielles de la MESE sont d'assurer :

- **L'expertise agronomique et la conformité des règles d'épandages** des dossiers tout au long de la filière d'épandage dans le cadre des Études Préalables d'épandage (EPE), des Bilans Agronomiques (BA), des Programmes Prévisionnels d'Épandages (PPE).
- **Un rôle de conseil, d'information et de communication** auprès des collectivités, des agriculteurs, des prestataires à l'épandage sur le thème de la valorisation agricole et du retour de la matière organique au sol.
- **La pérennité de la filière de recyclage des boues en agriculture** en améliorant la qualité des boues recyclées, la traçabilité et la fiabilité des épandages.

### Et le Réseau des MESE d'Oc. ?

Le travail en réseau des MESE renforce, d'une part, la qualité et l'homogénéité de l'expertise départementale et, d'autre part, l'interprétation technique des textes tout en apportant **des réponses à travers des références, des méthodes et des outils communs d'aide à l'expertise.** Il constitue par ailleurs une force de proposition au niveau national (SILLAGE, Laboratoires, COMIFER, etc.).



# Sommaire

<b>REFERENCES GENERALES .....</b>	<b>3</b>
1. CALENDRIER D'OCCUPATION ET PERIODES D'APPORT PRECONISEES PAR LE RESEAU DES MESE D'Oc. ....	3
2. RENDEMENTS PREVISIONNELS (OU OBJECTIFS DE RENDEMENT) .....	4
a. <i>Hors zone vulnérable*</i> .....	4
b. <i>En zone vulnérable</i> .....	5
<b>DOSE D'AZOTE A APPORTER.....</b>	<b>6</b>
1. DESCRIPTIF DE LA METHODE .....	6
2. FORMULE GENERALE .....	6
3. BESOINS .....	7
a. <i>Besoins de la culture (Pf)</i> .....	7
b. <i>Azote restant dans le sol à la fermeture du bilan (Rf)</i> .....	8
4. FOURNITURES.....	9
5. CAU.....	12
6. EXEMPLE DE CALCUL POUR N.....	13
<b>DOSES DE P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ET K<sub>2</sub>O A APPORTER .....</b>	<b>14</b>
1. FORMULE DE CALCUL .....	14
2. EXPORTATIONS ① .....	15
3. COEFFICIENT MULTIPLICATIF DES EXPORTATIONS ② .....	16
a. <i>Valeurs des teneurs-seuils des analyses de sol Timp. et Trenf.</i> .....	16
b. <i>Analyses de terre des parcelles de référence</i> .....	18
<b>Préconisations du réseau des MESE d'Oc.</b> .....	18
c. <i>Tableaux des coefficients multiplicatifs</i> .....	18
4. SUPPLEMENT LIE A L'EXPORTATION DES PAILLES DE LA CULTURE N-1 ③.....	21
a. <i>Comparaison des teneurs du sol en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O (issues de l'analyse de terre) à Timp.</i> .....	21
b. <i>Rendement de pailles de la culture N-1</i> .....	21
c. <i>Teneur en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O des résidus de pailles de la culture N-1</i> .....	22
5. PLAFOND DE DOSE A NE PAS DEPASSER .....	22
6. EXEMPLE DE CALCUL POUR P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ET K <sub>2</sub> O.....	22
<b>QUANTITE DE BOUES OU COMPOSTS DE BOUES A APPORTER .....</b>	<b>24</b>
<b>FERTILISATION COMPLEMENTAIRE POUR L'ANNEE N.....</b>	<b>25</b>
<b>EXEMPLES .....</b>	<b>26</b>
1. RAPPELS.....	26
a. <i>Rappels des différents cas de figure des types d'apports en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O</i> .....	26
b. <i>Rappel des données de l'exemple</i> .....	26
2. DOSES PREVISIONNELLES A APPORTER PAR LES BOUES .....	27
3. QUANTITES DE PRODUIT ORGANIQUE A APPORTER EN FONCTION DE CHAQUE ELEMENT .....	27
4. QUANTITES FINALES RETENUES EN FONCTION DE L'ELEMENT LIMITANT .....	28
5. DOSES FINALEMENT APORTEES .....	28
6. FERTILISATION COMPLEMENTAIRE POUR L'ANNEE N .....	28
7. CONCLUSION.....	28
<b>SCHEMA DE SYNTHESE DU RAISONNEMENT DE LA FERTILISATION DU MAÏS .....</b>	<b>29</b>
<b>LISTE BIBLIOGRAPHIQUE .....</b>	<b>30</b>
<b>ANNEXES.....</b>	<b>31</b>



## Liste des tableaux

---

Tableau 1 : Calendrier d'occupation et périodes d'apport préconisées par le réseau des MESE d'Oc.	3
Tableau 2 : Rendements prévisionnels ou objectifs de rendement .....	4
Tableau 3 : Calcul du rendement prévisionnel en zone vulnérable .....	5
Tableau 4 : Rendements de référence en zone vulnérable .....	5
Tableau 5 : Azote absorbé par unité de rendement prévisionnel.....	7
Tableau 6 : Cas du maïs semence : besoin en azote par hectare de rangs femelle en fonction de l'objectif de rendement .....	7
Tableau 7 : Cas du maïs semence : coefficient des sols des rangs femelles.....	8
Tableau 8 : Azote restant dans le sol à la fermeture du bilan (Rf) pour le maïs .....	8
Tableau 9 : Minéralisation nette de l'humus du sol (Mh) pour le maïs.....	10
Tableau 10 : Minéralisation nette due à un retournement de prairie (Mhp) pour le maïs (en kg N/ha)	11
Tableau 11 : Minéralisation nette de résidus de récolte (Mr) .....	11
Tableau 12 : Minéralisation nette de résidus de cultures intermédiaires (MrCi) .....	12
Tableau 13 : Valeurs de CAU proposées par le COMIFER pour le Sud-Ouest pour le maïs.....	13
Tableau 14 : Exemple de calcul de dose à apporter avant semis de maïs grain.....	13
Tableau 15 : Cas de figure des types d'apports en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> et K <sub>2</sub> O .....	14
Tableau 16 : Teneur en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> et K <sub>2</sub> O par unité de rendement .....	15
Tableau 17 : Exigence du maïs en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> et K <sub>2</sub> O et teneurs-seuils en ces éléments pour les sols du Sud-Ouest et pris par extension pour les sols du Languedoc-Roussillon .....	17
Tableau 18 : Grille des coefficients multiplicatifs des exportations pour K <sub>2</sub> O appliqués à la récolte principale (maïs).....	19
Tableau 19 : Grille des coefficients multiplicatifs des exportations pour P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Joret-Hébert appliqués à la récolte principale (maïs).....	19
Tableau 20 : Grille des coefficients multiplicatifs des exportations pour P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Dyer appliqués à la récolte principale (maïs).....	20
Tableau 21 : Grille des coefficients multiplicatifs des exportations pour P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Olsen appliqués à la récolte principale (maïs).....	20
Tableau 22 : Rendements des résidus de culture précédant le maïs .....	21
Tableau 23 : Hypothèses de calcul sur maïs .....	22
Tableau 24 : Exemple de calcul de doses de phosphore et de potasse efficaces (cas B).....	23
Tableau 25 : Calcul de l'APL .....	36
Tableau 26 : Valeur de A, azote fourni à la culture précédente par la minéralisation.....	37
Tableau 27 : Minéralisation nette due à un retournement de prairie (Mhp) pour le maïs (en kg N/ha)	37
Tableau 28 : Minéralisation nette de résidus de cultures intermédiaires (MrCi) .....	37
Tableau 29 : Azote absorbé par unité de rendement par le précédent.....	38
Tableau 30. Estimation de Ri à partir de l'APL et du cumul de pluie hivernale dans le bilan azoté du maïs.....	39
Tableau 31 : APL dans le cas d'un précédent légumineuses .....	41
Tableau 32 : Ri dans le cas d'un précédent prairie ou jachère .....	42
Tableau 33 : Ri dans le cas d'une culture intermédiaire .....	43
Tableau 34 : Exemples de calcul du Ri .....	43

## Introduction

---

Depuis 1995 les Missions d'Expertise et de Suivi des Épandages (MESE) d'Occitanie interviennent dans l'expertise et l'accompagnement de la filière épandage des boues et composts de boues urbaines. Face aux évolutions réglementaires et agronomiques, il est apparu nécessaire de créer un référentiel régional relatif au raisonnement des apports en azote, phosphore et potasse de ces déchets et présentant les différents paramètres afférents (notamment les coefficients d'équivalence engrais N et P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>).

Le contexte réglementaire de la révision de l'application de la Directive Nitrates au niveau de l'Etat français, le zonage augmenté en raison du critère eutrophisation pour lequel azote et phosphore sont responsables, et enfin la présence de plans d'épandage dans ces zones vulnérables rendent nécessaire la régionalisation des références de raisonnement pour ces deux éléments.

Le raisonnement de la dose faisant partie intégrante du rôle des MESE dans le cadre de leur mission d'expertise agronomique, le réseau des MESE d'Oc. a rédigé ce document principalement à destination des bureaux d'études en ciblant les boues et composts de boues urbaines.

Le référentiel N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O se compose de neuf cahiers correspondant à neuf types de cultures ayant été identifiées comme recevant à ce jour des boues ou composts de boues urbaines non normés.

Concernant les composts de boues, le raisonnement d'apport d'humus n'est pas traité dans ce référentiel, ce dernier étant axé sur le raisonnement de l'apport des éléments fertilisants N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O.

Pour le raisonnement d'apport d'humus des composts de boues, se référer au Guide des produits organiques utilisables en Languedoc-Roussillon (CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE LANGUEDOC-ROUSSILLON, 2011).

Les termes mentionnés avec un astérisque noir \* dans le document sont définis avec les sigles dans un document à part intitulé « Glossaire et Sigles ». L'astérisque n'apparaît dans le texte que lors de la 1<sup>ère</sup> occurrence.

Ce « Glossaire et Sigles » est disponible en ligne sur le site de la Chambre régionale d'agriculture Occitanie. Il est utilisable pour l'ensemble des documents élaborés par le réseau des MESE d'Oc.

## Préalables

---

1. Le réseau des MESE d'Oc. retient l'hypothèse suivante : la **parcelle de référence** dans les différents dossiers réglementaires (études préalables d'épandage (EPE\*), programmes prévisionnels d'épandage (PPE\*), bilans agronomiques (BA\*), synthèses annuelles du registre d'épandage) a toute sa signification, c'est-à-dire « **référence** » pour calculer, via ses analyses de sol, les quantités prévisionnelles de boues et composts de boues à apporter pour le groupe de parcelles auquel elle est rattachée.

En conséquence, cette parcelle sert aussi de référence pour le calcul de la fertilisation complémentaire qui sera conseillée ; notamment par la prise en compte des éléments P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O, voire MgO, déterminés dans ses analyses de sol.

2. Dans l'attente de nouvelles références et par simplification, le réseau des MESE d'Oc. préconise de ne pas tenir compte des **Keq N et Keq P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> de 2<sup>ème</sup> année** dans le calcul de la fertilisation complémentaire.

3. De même, le réseau des MESE d'Oc. fait l'hypothèse que les **teneurs du sol en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O** n'ont pas évolué, lorsque l'analyse de sol d'une parcelle de référence date de plusieurs années avant l'apport de boues ou de composts de boues. Ainsi les analyses datant de 2015, prises dans les exemples choisis, n'ont pas vu leurs teneurs en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O évoluer.

4. L'application stricte du raisonnement agronomique de la dose de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (sur prairies notamment) peut amener à considérablement réduire la quantité de boues ou composts de boues à apporter. Le réseau des MESE d'Oc. a fait des **propositions pragmatiques de façon à concilier raisonnement agronomique et pérennité de la filière d'épandage**. Cependant, il souligne le besoin d'informations techniques supplémentaires et d'évaluation des conséquences sur la filière (faisabilité technique du matériel d'épandage, parcellaire disponible, stock et devenir du phosphore dans les sols, concurrence avec d'autres effluents, etc.) afin de consolider ou de réactualiser les préconisations que le réseau émet.

5. Le contenu de ce document, créé entre 2015 et 2018, pourra évoluer en fonction des références du COMIFER et du Groupe Régional d'Expertise « Nitrates » d'Occitanie, dont la mobilisation est annoncée pour fin 2018.

## Références générales

### 1. Calendrier d'occupation et périodes d'apport préconisées par le réseau des MESE d'Oc.

Tableau 1 : Calendrier d'occupation et périodes d'apport préconisées par le réseau des MESE d'Oc.

Cultures	Produits ou déchets organiques utilisés	Type I ou II selon le C/N*	Semis	Récolte	Périodes d'apport validées par le réseau des MESE d'Oc. en fonction des doses N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O et des prélèvements des cultures	Périodes d'épandage <u>déconseillées</u> hors zones vulnérables (CPBA*)	Périodes d'épandage <u>interdites</u> en zones vulnérables
Maïs consommation (ou grain) irrigué			Mi-avril à mi-mai	Fin septembre à décembre	<b>Si apport avant semis</b> : pas plus d'1 mois entre apport et semis (mi-mars à mi-mai)		
Maïs semence	Boues urbaines (Liquides, pâteuses, solides et issues de lagunes)	Type II (C/N ≤ 8)	Mi-avril à mi-juin	Fin septembre à fin octobre	<b>Si apport avant semis</b> : pas plus d'1 mois entre apport et semis (mi-mars à mi-juin)	1 <sup>er</sup> juillet au 15 janvier	Si précédée d'une CIPAN* : du 1 <sup>er</sup> juillet à 15 jours avant l'implantation de la CIPAN et de 20 jours avant la destruction de la CIPAN jusqu'au 31 janvier  Si non précédée d'une CIPAN : du 1 <sup>er</sup> juillet au 31 janvier
Maïs fourrage			Avril-mai	Mi-août	<b>Si apport avant semis</b> : pas plus d'1 mois entre apport et semis (mi-mars à mi-juin)		

Source : Données issues des référents techniques des Chambres d'agriculture concernées.

**Nota Bene** : Au sens de la PAC\*, on parle de culture d'hiver\* si elle est semée avant le 1<sup>er</sup> janvier (exemple de cultures d'hiver : colza en septembre, blé en octobre-novembre et pois en décembre). Semée après le 1<sup>er</sup> janvier, on parle de culture de printemps\*.



## 2. Rendements prévisionnels (ou objectifs de rendement)

### a. Hors zone vulnérable\*

Le rendement prévisionnel\* (ou objectif de rendement) fourni par l'agriculteur au bureau d'études en fonction de sa connaissance de la parcelle (conditions pédoclimatiques, culture) doit être proche des valeurs-guides fournies dans le **Tableau 2**.

En cas de dépassement de ces valeurs-guides, justifier les rendements fournis dans les EPE, extensions de périmètre, PPE et BA.

Tableau 2 : Rendements prévisionnels ou objectifs de rendement

Cultures	AUDE		GARD				HERAULT	LOZERE			PYRENEES-ORIENTALES				Unité
	Est Audois	Ouest audois	Camargue	Vallée du Rhône – Vistre	Uzège – Sommières	Nord du Gard	Ensemble du département	Aubrac	Margeride	Vallée du Lot	Salanque	Perpignan	Bassin d'Elne	Cerdagne	
<b>Maïs consommation (ou grain) irrigué</b>	85	100	90 - 150	90 - 150	90 - 150	90 - 150	80 - 180					75 - 115			q/ha
<b>Maïs semence</b>		20 - 30	précoce : 30 - tardif : 45	précoce : 30 - tardif : 45		précoce : 30 - tardif : 45	30-70				25	20			q/ha
<b>Maïs fourrage (ensilage)</b>		7					6 - 10		7-17	7-18			irrigué : 12,5	irrigué : 12,5	t MS/ha

Source : Données issues des référents techniques des Chambres d'agriculture concernées

## b. En zone vulnérable

Rendement prévisionnel à fournir selon deux possibilités :

► Cas A : L'agriculteur cultive l'espèce depuis plus de 5 ans

Le rendement prévisionnel correspond à la moyenne des rendements des 5 dernières années selon la définition réglementaire.

Le **Tableau 3** peut être utilisé par les bureaux d'études qui le transmettront à l'agriculteur pour renseignement. L'agriculteur peut de son côté disposer d'un document de saisie qui lui est propre et répondant au même objectif.

**Tableau 3 : Calcul du rendement prévisionnel en zone vulnérable**

Calcul du rendement prévisionnel				
1. Je saisis mes rendements réalisés pour les 5 dernières années 2. J'exclue la valeur la plus basse et la plus haute 3. Je fais la moyenne des trois valeurs restantes				
Année N-5	Année N-4	Année N-3	Année N-2	Année N-1
Moyenne des 3 valeurs restantes en q/ha :				

► Cas B : l'agriculteur cultive l'espèce pour la 1<sup>ère</sup> fois

Absence de l'historique des rendements réalisés sur les cinq dernières années. Le rendement prévisionnel est alors un rendement de référence\* issu du **Tableau 4**.

*Exemple de situation : nouveau producteur qui n'a pas de référence sur la culture concernée ou agriculteur qui n'a jamais produit la culture concernée en zone vulnérable.*

**Tableau 4 : Rendements de référence en zone vulnérable**

Cultures	AUDE	GARD	HERAULT	PYRENEES-ORIENTALES	Unité
Mais grain sec	60	60	60	40	q/ha
Mais grain irrigué	100	100	100	100	q/ha
Mais semence	35	35	35	35	q/ha
Mais fourrage	15	15	15	15	t MS/ha

*Source : Annexe 11 de l'arrêté préfectoral régional de Languedoc-Roussillon du 5 septembre 2012 n°120285 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée en agriculture pour la région Languedoc-Roussillon.*

# Dose d'azote à apporter

## 1. Descriptif de la méthode

La méthode de calcul de la dose d'azote est issue du bilan azoté\* proposé par le COMIFER et adapté par ARVALIS : le raisonnement de la fertilisation est basé sur l'équilibre entre les besoins de la plante et les apports qui peuvent être fournis par le sol au cours de la campagne culturale.

Cf. **Annexe 1** et **Annexe 2**.

Le GREN décrit la méthode du référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée en zone vulnérable.

### Préconisations du réseau des MESE d'Oc.

Utiliser ce référentiel pour calculer la dose d'azote, aussi bien en et hors zone vulnérable.

## 2. Formule générale

$$\text{Dose totale à apporter} = (\text{« BESOINS »} - \text{FOURNITURES}) / \text{CAU}$$

<b>« BESOINS »</b>	= <b>Besoins de la culture Pf*</b> (kg N/ha) + <b>Azote restant dans le sol à la fermeture du bilan Rf*</b> (kg N/ha)
<b>FOURNITURES</b>	= <b>Azote minéral dans le sol à l'ouverture du bilan Ri*</b> (kg N/ha) + <b>Minéralisation nette de l'humus du sol Mh*</b> (kg N/ha) + <b>Minéralisation nette due à un retournement de prairie Mhp*</b> (kg N/ha) + <b>Minéralisation nette de résidus de récolte Mr*</b> (kg N/ha) + <b>Minéralisation nette de résidus de culture intermédiaire MrCi*</b> (kg N/ha) + <b>Azote apporté par l'eau d'irrigation Nirr</b> (kg N/ha)
<b>CAU</b>	<b>Coefficient apparent d'Utilisation de l'engrais minéral</b> (sans unité)

Source : GREN.

### Préconisations du réseau des MESE d'Oc.

Limiter l'apport d'azote avant semis à **50 kg N efficace/ha**.

**AVERTISSEMENTS :**

Cette méthode ne propose pas de méthode de calcul pour la dose d'azote à apporter avant semis du maïs. En effet, le raisonnement conseillé par ARVALIS est à prendre en compte à partir de la date d'ouverture du bilan c'est-à-dire au stade 4 feuilles. Utiliser toutefois cette formule générale pour le calcul de dose d'azote à apporter par les boues / composts de boues avant semis.

**3. Besoins**

$$\text{« BESOINS »} = \text{Besoins de la culture Pf* (kg N/ha)} + \text{Azote restant dans le sol à la fermeture du bilan Rf* (kg N/ha)}$$

**a. Besoins de la culture (Pf)**

$$\text{Pf} = [\text{Rendement prévisionnel} \times \text{Azote absorbé par unité de rendement prévisionnel (b)}]$$

► Cas du maïs grain et fourrage

Tableau 5 : Azote absorbé par unité de rendement prévisionnel

Cultures	Niveaux de rendement (R) ou type d'épis	Azote absorbé par unité de rendement prévisionnel* ou besoin par unité de production (b) kg N /q ou t MS
Maïs grain	R < 100 q/ha	2,3
	100 ≤ R ≤ 120 q/ha	2,2
	R > 120 q/ha	2,1
Maïs fourrage	R < 14 t MS/ha	14
	14 ≤ R ≤ 18 t MS/ha	13
	R > 18 t M/ha	12

Source : GREN.

► Cas du maïs semence

$$\text{Besoin} = \text{Pf} / \text{Coefficient d'occupation des sols}$$

Tableau 6 : Cas du maïs semence : besoin en azote par hectare de rangs femelle en fonction de l'objectif de rendement

Objectif de rendement des rangs femelles à 15% q/ha	Besoin en azote : Pf kg N/ha de femelle
[0-10[	70
[10-15[	85
[15-20[	95
[20-25[	105
[25-30[	115
[30-35[	125
[35-40[	130
[40-45[	135
[45-50[	140
[50-55[	145
[55-60[	150
[60-70[	155
[70-...	165

Source : GREN.

La valeur du besoin par ha des rangs femelle doit être ajustée en fonction du dispositif de semis (Tableau 7)

Tableau 7 : Cas du maïs semence : coefficient des sols des rangs femelles

Dispositif de semis	6x3	6x2	4x2 normal	4x2 Réduit	4x3	2x1x2x2 Réduit	2x2	Inter planting	Semences de base
Coefficient d'occupation par les femelles	0,75	0,77	0,69	0,71	0,67	0,63	0,57	0,67	1

Source : GREN.

## b. Azote restant dans le sol à la fermeture du bilan (Rf)

**Rf** = quantité d'azote minéral dans le sol à la fermeture du bilan, soit à la récolte de la culture, quantité que les racines n'ont pas été capables d'extraire et qui reste dans le sol après récolte. Elle dépend de la culture, du type de sol et de la profondeur d'enracinement.  
= appelé aussi **reliquat azoté final ou reliquat d'azote à la récolte** (kg N/ha).

Tableau 8 : Azote restant dans le sol à la fermeture du bilan (Rf) pour le maïs

Type de sol en Midi-Pyrénées		Argile (%)	CaCO <sub>3</sub> (%)	MO (%)	Cailloux (%)	Rf kg N/ha
N° de sol	Nom vernaculaire					
1	Alluvions caillouteuses	20	0	1,5	25	15
2	Alluvions sableuses	10	0	1,5	0	15
3	Alluvions limoneuses à limono argileuses	20	0	1,5	0	30
4	Alluvions argilo-limoneuses à argileuses	35	0	1,7	0	15
5	Alluvions caillouteuses calcaires	20	20	1,5	25	15
6	Alluvions sableuses calcaires	10	20	1,5	0	40
7	Alluvions limoneuses à limono argileuses calcaires	20	20	1,5	0	30
8	Alluvions argilo-limoneuses à argileuses calcaires	35	20	1,7	0	10
9	Boulbène caillouteuse superficielle	15	0	1,5	25	15
10	Boulbène superficielle	15	0	1,5	0	30
11	Boulbène profonde	15	0	1,5	0	20
12	Boulbène moyenne	15	0	1,5	0	20
13	Argilo-calcaire superficiel (rendosols)	30	20	1,5	0	30
14	Argilo-calcaire profond (calcosols)	33	10	1,7	0	20
15	Argilo-calcaire moyen (calcosols)	33	10	1,6	0	30
16	Argilo-calciques (calcisols)	35	0	2	0	20
17	Argilo-acides (brunisols)	30	0	2	5	15
18	Sols des Causses	30	10	2	30	15
19	Ségala (sols acides limono-sableux à limono-argilo-sableux) – MO élevé	20	0	3	20	20
20	Argilo calcaires à cailloux	30	25	1,5	25	20
21	Argileux acides à cailloux	30	0	1,5	25	2
22	Ségala (sols acides limono-sableux à limono-argilo-sableux) - MO faible	20	0	1,8	20	15

Source : GREN.



## 4. Fournitures

### FOURNITURES

- = **Azote minéral dans le sol à l'ouverture du bilan Ri** (kg N/ha)
- + **Minéralisation nette de l'humus du sol Mh** (kg N/ha)
- + **Minéralisation nette due à un retournement de prairie Mhp** (kg N/ha)
- + **Minéralisation nette de résidus de récolte Mr** (kg N/ha)
- + **Minéralisation nette de résidus de culture intermédiaire MrCi** (kg N/ha)
- + **Azote apporté par l'eau d'irrigation Nirr** (kg N/ha)

#### ► Azote minéral à l'ouverture du bilan (Ri)

- Ri** = quantité d'azote minéral dans le sol à l'ouverture du bilan (au semis de la culture soit le 1<sup>er</sup> mai par convenance)
- = appelé aussi **reliquat azoté initial** ou **reliquat sortie hiver** (kg N efficace/ha).

Deux méthodes permettent de connaître la valeur du Ri :

- 1° - un calcul faisant intervenir le bilan azoté du précédent et un modèle agro-météorologique,
- 2° - une mesure de reliquat d'azote minéral à l'ouverture du bilan.

#### 1<sup>ère</sup> méthode : le bilan azoté du précédent et le modèle agro-météorologique

Cf. **Annexe 3**.

#### 2<sup>ème</sup> méthode : Ri donné par une mesure de reliquat d'azote

##### ▪ Quand prélever Ri ?

Pour être valables, tous les termes du bilan doivent être calculés/mesurés/évalués à la même date. Ainsi, la période d'ouverture du bilan sera également la période du prélèvement et donc de mesure de Ri.

**Période d'ouverture du bilan azoté\* retenue = période de mesure de Ri :**

Si ouverture avant semis (dernière méthode ARVALIS) : 1<sup>er</sup> mai (par convenance).

##### ▪ Où prélever Ri ?

Sur au moins deux horizons 0 - 30 et 30 - 60 cm. Si la profondeur de sol le permet, prélever l'horizon 60 - 90 cm.

### Préconisations du réseau des MESE d'Oc.

#### ► **En zone vulnérable**

- Utiliser l'une des deux méthodes précédemment expliquées.
- Réaliser l'analyse du reliquat azoté selon les méthodes de prélèvement préconisées par ARVALIS.

#### ► **Hors zone vulnérable**

Possibilité de prendre par défaut ces valeurs en fonction du précédent cultural :

- Prédécent légumineuse : Ri = 75 kg N/ha.
- Prédécent prairie de 1 à 2 ans : Ri = 45 kg N/ha.
- Précédents autre que légumineuse et prairie : Ri = 30 kg N/ha.

► Minéralisation nette de l'humus du sol (Mh)

C'est une estimation prévisionnelle de la quantité d'azote minéral provenant de la minéralisation de l'humus du sol qui sera disponible pour le maïs pendant sa croissance après l'ouverture du bilan.

**Tableau 9 : Minéralisation nette de l'humus du sol (Mh) pour le maïs**

Type de sol en Midi-Pyrénées		Argile (%)	CaCO <sub>3</sub> (%)	MO (%)	Cailloux (%)	Mh kg N/ha		
N° de sol	Nom vernaculaire					Maïs sec (grain et ensilage)	Maïs grain et ensilage irrigué	Maïs semence irrigué
1	Alluvions caillouteuses	20	0	1,5	25	30	40	30
2	Alluvions sableuses	10	0	1,5	0	55	80	60
3	Alluvions limoneuses à limono argileuses	20	0	1,5	0	70	100	65
4	Alluvions argilo-limoneuses à argileuses	35	0	1,7	0	55	75	50
5	Alluvions caillouteuses calcaires	20	20	1,5	25	20	30	25
6	Alluvions sableuses calcaires	10	20	1,5	0	50	75	55
7	Alluvions limoneuses à limono argileuses calcaires	20	20	1,5	0	55	75	50
8	Alluvions argilo-limoneuses à argileuses calcaires	35	20	1,7	0	40	55	40
9	Boulbène caillouteuse superficielle	15	0	1,5	25	35	45	35
10	Boulbène superficielle	15	0	1,5	0	45	65	50
11	Boulbène profonde	15	0	1,5	0	55	80	60
12	Boulbène moyenne	15	0	1,5	0	55	80	60
13	Argilo-calcaire superficiel (rendosols)	30	20	1,5	0	20	30	25
14	Argilo-calcaire profond (calcosols)	33	10	1,7	0	30	45	35
15	Argilo-calcaire moyen (calcosols)	33	10	1,6	0	30	45	30
16	Argilo-calciques (calcisols)	35	0	2	0	40	60	45
17	Argilo-acides (brunisol)	30	0	2	5	45	65	50
18	Sols des Causses	30	10	2	30	20	20	20
19	Ségala (sols acides limono-sableux à limono-argilo-sableux) à MO élevé	20	0	3	20	70	110	70
20	Argilo calcaires à cailloux	30	25	1,5	25	20	30	20
21	Argileux acides à cailloux	30	0	1,5	25	25	40	30
22	Ségala (sols acides limono-sableux à limono-argilo-sableux) à MO faible	20	0	1,8	20	40	65	45

Source : GREN.

► Minéralisation nette due à un retournement de prairie (Mhp)\*

La minéralisation nette due à un retournement de prairie (Mhp) est prise en compte uniquement pour la 1<sup>ère</sup> année après destruction de la prairie. Au-delà, celle-là est considérée comme nulle.

**Tableau 10 : Minéralisation nette due à un retournement de prairie (Mhp) pour le maïs (en kg N/ha)**

Type de production de prairies	Mode d'exploitation	Age de la prairie			
		< 18 mois	2 - 3 ans	4 - 5 ans	6 - 10 ans
Graminées + légumineuses	Pâturage				
	Pâturage + Fauche	20	60	100	120
	Fauche uniquement				
Graminées pures	Pâturage (= pâturage intégral)	20	60	100	120
	Pâturage + Fauche	14	42	70	84
	Fauche uniquement (= fauche intégrale)	8	24	40	48

Source : GREN.

*Nota Bene* : il n'y a pas d'effet azote lorsque la prairie est retournée à l'automne précédent une culture d'été.

► Minéralisation nette de résidus de récolte (Mr)

**Tableau 11 : Minéralisation nette de résidus de récolte (Mr)**

Précédent Ouverture du bilan en sortie d'hiver	Mr kg N/ha
Avoine (printemps et hiver) pailles enlevées	0
Avoine (printemps et hiver) pailles restituées	-10
Blé tendre pailles enlevées	0
Blé tendre pailles restituées	-10
Blé dur pailles enlevées	0
Blé dur pailles restituées	-10
Colza	10
Maïs doux épis + spathes	0
Maïs doux épis dépouillés	0
Maïs fourrage	0
Maïs grain	0
Maïs semence	0
Orge (hiver ou printemps) pailles enlevées	0
Orge (hiver ou printemps) pailles restituées	-10
Seigle pailles enlevées	0
Seigle pailles restituées	-10
Sorgho ensilage	0
Sorgho grain	0
Tournesol	0
Triticale pailles enlevées	0
Triticale pailles restituées	-10
Pois	10
Féverole	20
Lupin	0
Soja	10
Prairie	0
Culture intermédiaire	0
Luzerne (retournement fin été/début automne) : âge de la luzerne 2 ans	30
Luzerne (retournement fin été/début automne) : âge de la luzerne 3 ans	20
Luzerne (retournement printemps)	0 (Préconisation du réseau des MESE d'Occ., en l'absence de références)
Betterave	10
Carotte	0
Endive	0
Pommes de terre	10
Cultures cynégétiques (mélange graminées/légumineuses ou graminées pures)	0

Source : GREN.

► Minéralisation nette de résidus de cultures intermédiaires (MrCi)

Tableau 12 : Minéralisation nette de résidus de cultures intermédiaires (MrCi)

Type de culture intermédiaire	Production de la culture intermédiaire t MS/ha	Ouverture du bilan au semis du maïs
		Destruction avant semis du maïs (novembre/décembre) kg N/ha
Crucifères (moutarde, radis ...)	≤ 1	0
	2 (> 1 et < 3)	5
	≥ 3	10
Graminées de type seigle, avoine	≤ 1	0
	2 (> 1 et < 3)	0
	≥ 3	5
Graminées de type ray-grass	≤ 1	0
	2 (> 1 et < 3)	5
	≥ 3	10
Légumineuses	≤ 1	5
	2 (> 1 et < 3)	10
	≥ 3	20
Hydrophyllacées (Phacélie)	≤ 1	0
	2 (> 1 et < 3)	0
	≥ 3	5
Mélanges graminée/ légumineuses	≤ 1	3
	2 (> 1 et < 3)	5
	≥ 3	13
Mélanges crucifères/ légumineuses	≤ 1	3
	2 (> 1 et < 3)	8
	≥ 3	15

Source : GREN.

► Azote apporté par l'eau d'irrigation Nirr

**Nirr** (kg N/ha) = [Quantité d'eau d'irrigation prévue jusqu'à 3 semaines après floraison (mm) x teneur en nitrate de l'eau (mg NO<sub>3</sub>/l)] / 443

**Préconisations du réseau des MESE d'Oc.**

Prendre les valeurs par défaut suivantes :

Nirr = 0 kg N/ha de 0 à 100 mm d'eau d'irrigation,

Nirr = 5 kg N/ha de 100 à 200 mm d'eau d'irrigation,

Nirr = 10 kg N/ha au-delà de 200 mm d'eau d'irrigation.

## 5. CAU

**CAU** : Coefficient Apparent d'Utilisation de l'engrais minéral (sans unité)

Pour des raisons liées aux stades d'apports sur la culture, l'azote apporté par les engrais azotés est utilisé à des proportions diverses. Cela conduit à diviser les « besoins » de la culture auxquels sont retranchées les fournitures d'azote par le sol, par le CAU en fonction du stade des apports (= dose totale comprenant théoriquement les apports d'engrais minéraux et les apports organiques).

Tableau 13 : Valeurs de CAU proposées par le COMIFER pour le Sud-Ouest pour le maïs

Types de culture	Date d'apport d'azote	CAU
<b>Maïs grain de consommation</b> <b>Maïs fourrage</b>	Semis - 4 feuilles	0,6
	4 feuilles - floraison	0,8
<b>Maïs semence</b>	Semis - 4 feuilles	0,6
	4 - 12 feuilles et rendement < 30 q/ha	0,7

Source : GREN.

### Préconisations du réseau des MESE d'Oc.

Dans les différents dossiers réglementaires (EPE, extension de périmètre, PPE et BA), les apports de boues ou de composts de boues sont effectués avant semis du maïs. En conséquence et dans l'attente de nouvelles références, prendre un CAU de 0,6.

## 6. Exemple de calcul pour N

Tableau 14 : Exemple de calcul de dose à apporter avant semis de maïs grain

	Blé dur pailles exportées (N-1) / Maïs grain sec (N) – Sol argilo-calcaire profond, cycle long
<b>Pf</b> = Rendement prévisionnel du maïs grain (N) x Azote absorbé par unité de rendement prévisionnel	100 x 2,2 = 220
Rendement prévisionnel du maïs grain (N) <i>q/ha</i>	100
<b>b</b> Azote absorbé par unité de rendement prévisionnel <i>kg N/t MS</i>	2,2
<b>Rf</b> Reliquat du sol à fermeture bilan <i>kg N/ha</i>	20
<b>Ri</b> Reliquat du sol sortie hiver (Ouverture bilan) <i>kg N/ha</i>	30
<b>Mh</b> Minéralisation nette de l'humus du sol <i>kg N/ha</i>	30
<b>Mhp</b> Minéralisation nette due à un retournement de prairie <i>kg N/ha</i>	0
<b>Mr</b> Minéralisation nette de résidus de récolte <i>kg N/ha</i>	0
<b>MrCi</b> Minéralisation nette de résidus de culture intermédiaire <i>kg N/ha</i>	0
<b>Nirr</b> Azote apporté par l'eau d'irrigation <i>kg N/ha</i>	0
<b>CAU</b>	0,6
<b>Dose totale prévisionnelle à apporter sur le cycle total de la culture</b> [Pf + Rf – Ri – Mh – Mhp – Mr – MrCi – Nirr] / CAU <i>kg N/ha</i>	= (220 + 20 - 30 - 30 - 0 - 0 - 0 - 0) / 0,6 = 300
<b>D1 - Dose prévisionnelle à apporter par les boues ou composts de boues</b> <i>kg N efficace/ha</i>	D1 = 50



# Doses de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O à apporter

## 1. Formule de calcul

Selon la méthode du COMIFER (2009) :

**Doses P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O** (kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O/ha) =

**Exportations** (kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O/ha) **x Coefficient multiplicatif des exportations** + **Supplément**

① = rendement prévisionnel (q/ha) ④  
**x** teneur en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O par unité de rendement (kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O/q) ⑤

**Si** récolte des résidus de la culture N-1 (pailles, fanes, etc. exportées) :  
 Le supplément sert à compenser la non restitution au sol des éléments P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O du fait de l'exportation des pailles de la culture N-1.  
 ③ dépend de la **teneur du sol** analysée avant semis de la culture N.

**Si** teneur du sol en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O < Timp.\* :

③ **Supplément** = masse de résidus récoltés de la culture N-1 (t MB/ha) **x** teneur en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O des résidus (kg/t)  
*avec masse de résidus récoltés de la culture N-1 = rendement de pailles N-1 (t MB/ha)*

**Si** teneur du sol en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O > Timp.\* :

③ **Supplément** = 0

### Préconisations du réseau des MESE d'Occ.

Le réseau distingue 3 cas de figure en fonction de la fréquence d'apports de boues ou composts de boues et du respect des préconisations d'apport en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O (**Tableau 15**).

Privilégier toutefois les 2 premiers cas (A et B) qui consistent à apporter les boues ou composts de boues en tenant compte uniquement des besoins de la culture en tête de rotation (culture de l'année N), afin d'éviter des excès en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O lors d'un apport unique.

Le recours au cas C doit rester exceptionnel et doit être justifié.

**Tableau 15 : Cas de figure des types d'apports en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O**

<b>Cas A</b>	Apport tous les ans en respectant les doses d'apport en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> et K <sub>2</sub> O pour l'année N
<b>Cas B</b>	Apport tous les 2 ans en respectant les doses d'apport en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> et K <sub>2</sub> O pour l'année N
<b>Cas C</b>	Dans l'attente de références et par simplification, possibilité d'un cas alternatif : apport tous les 2 ans en respectant les doses d'apport en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> et K <sub>2</sub> O pour les années N et N+1. L'azote est apporté pour l'année N uniquement.  <i>Hypothèse de simplification : la culture et le rendement de l'année N+1 sont identiques à ceux de l'année N (le coefficient multiplicatif ne change pas entre les années N et N+1 : il n'y a pas de nouvelles analyses de sol et le nombre d'impasses reste identique).</i>

## 2. Exportations ①

**Exportations ①** = rendement prévisionnel ④ x teneur en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O par unité de rendement ⑤  
 (q/ha) (kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O/q)

### ④ Rendement prévisionnel

Cf. **Tableau 2.**

### ⑤ Teneur en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O par unité de rendement

**Tableau 16 : Teneur en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O par unité de rendement**

Espèce	Organe	Unité pour exportation	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
Avoine hiver/printemps	grain (culture N)	kg/q	0,75	0,45
Avoine hiver/printemps	paille (culture N-1)	kg/t MB	3	12
Blé dur	grain (culture N)	kg/q	0,85	0,45
Blé dur	paille (culture N-1)	kg/t MB	1,7	12,3
Blé tendre	grain (culture N)	kg/q	0,65	0,5
Blé tendre	paille (culture N-1)	kg/t MB	1,7	12,3
Cultures cynégétiques (mélange graminées/légumineuses ou graminées pures)	grain (culture N)	kg/q	0,85**	0,45**
Maïs fourrage (ou ensilage)	plante entière (culture N)	kg/t MS	4,2	11,9
Maïs grain	épi entier	kg/q	0,65	0,45
Maïs grain et maïs semence***	grain (culture N)	kg/q	0,6	0,55
Méteil grain	grain (culture N)	kg/q	0,67**	0,49**
Méteil grain	paille (culture N-1)	kg/t MB	2 **	12 **
Méteil ensilé	plante entière (culture N)	kg/t MS	7,3	35,5
Orge hiver/printemps	grain (culture N)	kg/q	0,65	0,55
Orge hiver/printemps	paille (culture N-1)	kg/t MB	1	12,9
Seigle	grain (culture N)	kg/q	0,65	0,45
Seigle	paille (culture N-1)	kg/t MB	3	12
Sorgho	grain (culture N)	kg/q	0,7	0,35
Sorgho fourrager (référence du maïs plante entière ensilée)	plante entière (culture N)	kg/t MS	4,2	11,9
Triticale	grain (culture N)	kg/q	0,65	0,5
Triticale	paille (culture N-1)	kg/t MB	2	10
Riz (Référence CFR 2015)	grain (culture N)	kg/q	1,2	0,5
Riz (Référence CFR 2015)	paille (culture N-1)	kg/q	0,78	2,25
Colza	grain (culture N)	kg/q	1,25	0,85
Colza	paille (culture N-1)	kg/t MB	1,7	14,5
Tournesol	grain (culture N)	kg/q	1,2	1,05

\*\* Préconisation du réseau des MESE d'Occ., en l'absence de références

\*\*\*Pour le maïs semence, la valeur de la teneur en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O par unité de rendement est fonction du coefficient d'occupation du sol. On ajuste la teneur en la divisant par le coefficient des sols des rangs femelles (**Tableau 7**).

Source : COMIFER (2007).

### 3. Coefficient multiplicatif des exportations ②

② est défini d'après les 3 critères suivants :

- Exigences\* des cultures en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O (**Tableau 17**) ;
- Teneur du sol : richesse ou non du sol de la parcelle de référence en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O ;
- Passé récent de fertilisation : nombre d'années sans apports depuis la dernière fertilisation = nombre d'impasses.

#### a. Valeurs des teneurs-seuils des analyses de sol Timp. et Trenf.

- **Timp.\* = teneur-seuil impasse** = teneur (pour la culture considérée) au-delà de laquelle on peut faire une impasse de fertilisation, sauf dans le cas des cultures fortement exigeantes.
- **Trenf.\* = teneur-seuil renforcement** = teneur en-dessous de laquelle il faut renforcer la fertilisation au-delà de l'entretien, sauf pour les cultures faiblement exigeantes.

Elles sont définies par classe d'exigence des cultures et régionalement par type de sol (ARVALIS, 1995) et n'ont pas fait l'objet de révision. Pour le territoire Languedoc-Roussillon, les teneurs-seuils en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Joret-Hébert, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Dyer, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Olsen et en K<sub>2</sub>O sont celles correspondant par défaut à la région Sud-Ouest (**Tableau 17**).

**Tableau 17 : Exigence du maïs en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O et teneurs-seuils en ces éléments pour les sols du Sud-Ouest et pris par extension pour les sols du Languedoc-Roussillon**

Culture	Exigence de la culture en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Teneurs-seuils P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Joret-Hébert (pH>7) mg/kg ou ppm		Teneurs-seuils P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Dyer (pH<7) mg/kg ou ppm		Teneurs-seuils P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Olsen (pH indifférent) mg/kg ou ppm		Exigence de la culture en K <sub>2</sub> O	Teneurs-seuils K <sub>2</sub> O mg/kg ou ppm	
		Trenf.	Timp.	Trenf.	Timp.	Trenf.	Timp.		Trenf.	Timp.
Maïs grain	Faiblement exigeante	40	Soils acides limoneux ou argileux (Boulbène, Ségala, alluvions) : 120	40	120	20	45	Moyennement exigeante	80	120
Maïs fourrage	Moyennement exigeante									
Maïs semence	Moyennement exigeante**	60	100	80		30	80	Moyennement exigeante**		

\*\* Préconisation du réseau des MESE d'Occ., en l'absence de références

Source : ARVALIS (1995).

## b. Analyses de terre des parcelles de référence

### Préconisations du réseau des MESE d'Occ.

Ne pas attendre le délai réglementaire des 10 ans pour réaliser des analyses de terres sur les parcelles de référence. Idéalement, elles sont analysées au moins tous les 5 ans.

- ▶ **Pour les parcelles de référence** : prendre les valeurs de la dernière analyse (quelle que soit la date de prélèvement).
- ▶ **Pour toutes les autres parcelles** (qui ne sont pas des parcelles de référence) :
  - **En cas d'analyse (de la parcelle) datant de moins de 5 ans** : prendre les valeurs de cette analyse plutôt que celles de la parcelle de référence à laquelle elle est rattachée.
  - **En cas d'absence d'analyse** : se référer aux résultats d'analyse de la parcelle de référence (quelle que soit la date de prélèvement).
  - **En cas d'analyse datant de plus de 5 ans** : se référer aux résultats d'analyse les plus récents, soit de la parcelle concernée, soit de la parcelle de référence.

## c. Tableaux des coefficients multiplicatifs

Les valeurs de ② sont récapitulées en fonction du niveau d'exigence en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O du maïs, de la teneur en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O du bulletin d'analyse et selon le nombre d'années d'impassage dans les **Tableau 18**, **Tableau 19**, **Tableau 20** et **Tableau 21** (COMIFER, 2009 ; ARVALIS, 1995).

Exemple

: **Données utilisées dans l'exemple de calcul en p. 19.**



Tableau 18 : Grille des coefficients multiplicatifs des exportations pour K<sub>2</sub>O appliqués à la récolte principale (maïs)

Types de culture	Nombre d'années d'impasses	Teneur du sol : positionner la teneur du bulletin d'analyse (Tba) par rapport aux seuils (en mg K <sub>2</sub> O/kg de terre ou ppm)									
		Tba < Trentf.	Trentf. < Tba < Timp. -10%	Timp. -10% < Tba < Timp.	Timp. -10% < Tba < Timp. < 120	Timp. < Tba < Timp. +10%	Timp. +10% < Tba < 2Timp.	2Timp. < Tba < 3Timp.	Tba > 3Timp.	Tba > 360	
Moyennement exigeantes	0 (ou apport tous les ans)	1,6	1,2	1	1,2	1	0,5	0			
	1 an (ou apport tous les 2 ans)	2,2	1,4	1,2	1	1	0,5	0			
	2 ans ou + (ou apport > à tous les 3 ans)	2,2	1,6	1,4	1,2	1	0,8	0			

Tableau 19 : Grille des coefficients multiplicatifs des exportations pour P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Joret-Hébert appliqués à la récolte principale (maïs)

Types de culture	Nombre d'années d'impasses	Teneur du sol : positionner la teneur du bulletin d'analyse (Tba) par rapport aux seuils (en mg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /kg de terre ou ppm)											
		Tba < Trentf.	Trentf. < Tba < Timp. -10%	Timp. -10% < Tba < Timp.	Timp. -10% < Tba < Timp. < 100	Timp. < Tba < Timp. +10%	Timp. +10% < Tba < 2Timp.	2Timp. < Tba < 3Timp.	Tba > 3Timp.	Tba > 360			
Moyennement exigeantes	0 (ou apport tous les ans)	1,6	1	1	1	0							
	1 an (ou apport tous les 2 ans)	1,8	1,2	1	1	0,8	0						
	2 ans ou + (ou apport > à tous les 3 ans)	2	1,7	1,5	1,2	1	0,6	0					
Faiblement exigeantes	Maïs grain	Soils acides limoneux ou argileux (boulbènes, alluvions, Ségala)	0 (ou apport tous les ans)	1,3	1	0,8							
			1 an (ou apport tous les 2 ans)	1,6	1	1							
			2 ans ou + (ou apport > à tous les 3 ans)	1,6	1,2	1							
			Soils basiques ou argillo-calcaires (terreforts, alluvions)	Tba < 40	40 < Tba < 90	90 < Tba < 100	100 < Tba < 110	110 < Tba < 200	200 < Tba < 300	Tba > 300			
			0 (ou apport tous les ans)	1,3	1	0,8							
			1 an (ou apport tous les 2 ans)	1,6	1	1							
			2 ans ou + (ou apport > à tous les 3 ans)	1,6	1,2	1							
			0 (ou apport tous les ans)	1,3	1	0,8							
			1 an (ou apport tous les 2 ans)	1,6	1	1							
			2 ans ou + (ou apport > à tous les 3 ans)	1,6	1,2	1							

**Tableau 20 : Grille des coefficients multiplicatifs des exportations pour P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Dyer appliqués à la récolte principale (maïs)**

Types de culture	Nombre d'années d'impasses	Teneur du sol : positionner la teneur du bulletin d'analyse (Tba) par rapport aux seuils (en mg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /kg de terre ou ppm)						
		Tba < Trenf.	Trenf. < Tba < Timp. -10%	Timp. - 10% < Tba < Timp.	Timp. < Tba < Timp. + 10%	Timp. + 10% < Tba < 2Timp.	2Timp. < Tba < 3Timp.	Tba > 3Timp.
<b>Moyennement exigeantes</b>	0 (ou apport tous les ans)	1,6	1	1	0	0	0	
	1 an (ou apport tous les 2 ans)	1,8	1,2	1	1	0,8	0	
	2 ans ou + (ou apport > à tous les 3 ans)	2	1,7	1,5	1,2	1	0,6	0
<b>Faiblement exigeantes</b>	Tba < 40	40 < Tba < 108	108 < Tba < 120	120 < Tba < 132	132 < Tba < 240	240 < Tba < 360	Tba > 360	
	1,3	1	0,8		0			
	1,6	1	1		0			
	2 ans ou + (ou apport > à tous les 3 ans)	1,6	1,2	1	0,8	0		

**Tableau 21 : Grille des coefficients multiplicatifs des exportations pour P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Olsen appliqués à la récolte principale (maïs)**

Types de culture	Nombre d'années d'impasses	Teneur du sol : positionner la teneur du bulletin d'analyse (Tba) par rapport aux seuils (en mg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /kg de terre ou ppm)						
		Tba < Trenf.	Trenf. < Tba < Timp. -10%	Timp. - 10% < Tba < Timp.	Timp. < Tba < Timp. + 10%	Timp. + 10% < Tba < 2Timp.	2Timp. < Tba < 3Timp.	Tba > 3Timp.
<b>Moyennement exigeantes</b>	0 (ou apport tous les ans)	1,6	1	1		0		
	1 an (ou apport tous les 2 ans)	1,8	1,2	1	1	0,8	0	
	2 ans ou + (ou apport > à tous les 3 ans)	2	1,7	1,5	1,2	1	0,6	0
<b>Faiblement exigeantes</b>	Tba < 20	20 < Tba < 40,5	40,5 < Tba < 45	45 < Tba < 49,5	49,5 < Tba < 90	90 < Tba < 135	Tba > 135	
	1,3	1	0,8	0				
	1,6	1	1					
	2 ans ou + (ou apport > à tous les 3 ans)	1,6	1,2	1	0,8	0		

#### 4. Supplément lié à l'exportation des pailles de la culture N-1 ③

Quand les résidus de culture N-1 sont enlevés (= récoltés, « exportés »), il faut ajouter une quantité supplémentaire de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O correspondant à l'exportation de ces résidus dans le calcul des doses de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O à apporter.

③ **supplément** dépend de la **teneur du sol** analysée avant semis de la culture N.

Si teneur du sol en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ou K <sub>2</sub> O < Timp. :	Si teneur du sol en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ou K <sub>2</sub> O > Timp. :
③ <b>Supplément</b> = masse de résidus récoltés de la culture N-1 (t MB/ha) x teneur en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ou K <sub>2</sub> O des résidus (kg/t) <i>avec masse de résidus récoltés de la culture N-1 = rendement de pailles N-1 (t MB/ha)</i>	③ <b>Supplément</b> = 0

##### a. Comparaison des teneurs du sol en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O (issues de l'analyse de terre) à Timp.

Cf. Tableau 17.

##### b. Rendement de pailles de la culture N-1

Les départements de la Lozère et des Pyrénées-Orientales ne sont pas concernés par des dossiers d'épandage de boues urbaines avant semis de maïs.

Tableau 22 : Rendements des résidus de culture précédant le maïs

Départements concernés	Précédents	Devenir des résidus de cultures N-1	Rendements des résidus de cultures N-1 t MB/ha
11	Blé dur	Enfouis/ Exportés	<b>Autres que le Narbonnais :</b> 2,5 - 4
30	Blé dur	Enfouis/ Exportés	3,5 - 4,5
34	Blé dur (avant maïs consommation - grain - irrigué)	Enfouis/ Exportés	Si blé dur en sec : <b>RU* faible (coteaux) :</b> 1,5 – 2,5 <b>RU élevée (plaines) :</b> 3 – 5  Si blé dur irrigué : <b>RU* faible (coteaux) :</b> 3 – 5 <b>RU élevée (plaines) :</b> 4 - 7
	Blé semence	Enfouis	-
	Maïs		
	Sorgho grain sec	Enfouis	-

Source : Données issues des référents techniques des Chambres d'agriculture concernées.

### c. Teneur en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O des résidus de pailles de la culture N-1

Cf. Tableau 16.

## 5. Plafond de dose à ne pas dépasser

Pour ces cultures, la dose calculée est plafonnée à 400 kg K<sub>2</sub>O/ha/an.

Aucun plafond en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> n'est mentionné par le COMIFER (COMIFER, 2009).

### Préconisations du réseau des MESE d'Oc.

Dans le cas d'un coefficient multiplicatif des exportations égal à 0, tolérance d'une dose maximale de 20 kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O/ha.

## 6. Exemple de calcul pour P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O

Tableau 23 : Hypothèses de calcul sur maïs

Prise en compte des préconisations d'apports du maïs en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> et K <sub>2</sub> O	
Rotation	Blé dur (N-1) / Maïs grain irrigué (N)
Gestion des résidus du blé dur (N-1)	Pailles exportées chaque année Rendement de pailles réalisé : 3,5 t/ha
Rendement prévisionnel du maïs (N)	Grains : 100 q/ha
Passé récent de fertilisation de la parcelle	Apport tous les 2 ans
Date de l'analyse de sol	2015
Type de sols	Sols acides limoneux ou argileux
Résultats de l'analyse de sol (Tba)	
en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Joret-Hébert :	0,095 g/kg = 95 mg/kg
en K <sub>2</sub> O :	0,11 g/kg = 110 mg/kg
Rappel de l'hypothèse prise par le réseau des MESE d'Oc.	Pour la parcelle de référence, les teneurs du sol n'ont pas varié depuis 2015, même si elle a reçu des épandages depuis (ainsi que son groupe de parcelles).

Tableau 24 : Exemple de calcul de doses de phosphore et de potasse efficaces (cas B)

	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
② Coefficient multiplicatif des exportations (voir ronds rouges dans les Tableau 18 et Tableau 19)	1	1,2
④ Rendement prévisionnel <i>q/ha</i>	100	100
⑤ Teneur en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ou K <sub>2</sub> O par unité de rendement de grain <i>kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O/q</i>	0,60	0,55
③ Supplément car exportation des pailles de la culture N-1	3,5 x 1,7 = 5,95	3,5 x 12,3 = 43,05
Rendement de pailles du blé dur (1) <i>t/ha</i>	3,5	3,5
Teneur en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ou K <sub>2</sub> O par unité de rendement de paille <i>kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O/t</i>	1,7	12,3
Doses totales prévisionnelles <i>kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O/ha</i>	= (1 x 100 x 0,6) + (3,5 x 1,7)	= (1,2 x 100 x 0,55) + (3,5 x 12,3)
	= 65,95 kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /ha arrondi à 66 kg/ha	= 109,05 kg K <sub>2</sub> O /ha arrondi à 109 kg/ha
Doses prévisionnelles à apporter par les boues ou composts de boues D2 et D3	D2 = 66 kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> efficace/ha	D3 = 109 kg K <sub>2</sub> O efficace/ha
Vérification par rapport au plafond <i>kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O/ha</i>	Pas de plafond retenu à ce jour ⇒ D2 validée	<< 400 kg K <sub>2</sub> O /ha ⇒ D3 validée

## Quantité de boues ou composts de boues à apporter

**Rappel pour l'apport de composts de boues :** le raisonnement est effectué vis-à-vis des éléments fertilisants et non en fonction de l'apport en humus. En effet, azote et phosphore sont en général les éléments limitants (indépendamment de certains éléments-traces métalliques). Le raisonnement d'apport d'humus n'est donc pas traité ici ; se référer au Guide des Produits organiques utilisables en Languedoc-Roussillon (CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE LANGUEDOC-ROUSSILLON, 2011).

### Formule générale

Quantité de boues ou composts de boues (t MB/ha) :

$$= \frac{\text{dose de l'élément (kg N ou P}_2\text{O}_5 \text{ ou K}_2\text{O efficace /ha)}}{\text{Teneur en l'élément total (kg N ou P}_2\text{O}_5 \text{ ou K}_2\text{O total/t MB} \times \text{Keq N ou P}_2\text{O}_5 \text{ ou K}_2\text{O (\%)}}$$

Avec :

	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
<b>Dose de l'élément</b> kg N ou P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ou K <sub>2</sub> O efficace /ha	<b>D1</b> : dose prévisionnelle d'azote de boue ou compost de boue kg N efficace/ha	<b>D2</b> : dose prévisionnelle de phosphore de boue ou compost de boue kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> efficace/ha	<b>D3</b> : dose prévisionnelle de potasse de boue ou composts de boue kg K <sub>2</sub> O efficace/ha
<b>Teneur en l'élément total de la boue ou du compost de boues</b> kg N ou P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ou K <sub>2</sub> O total /t MB	<b>Teneur en azote total</b> = azote organique + azote minéral (N-NO <sub>3</sub> + N-NH <sub>4</sub> ). kg N total/t MB  Par défaut, on utilise NTK = N organique + N-NH <sub>4</sub> car l'azote minéral est souvent très faiblement dosé.	<b>Teneur en phosphore total</b> kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> total/t MB	<b>Teneur en potasse totale</b> kg K <sub>2</sub> O total/t MB
<b>Coefficient d'équivalence engrais N ou P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O minéral efficace*</b> %	<b>Keq N</b> : Coefficient d'équivalence engrais N minéral efficace  Keq N 1 <sup>ère</sup> année = valeurs données en <b>Annexe 4</b> . Keq N 2 <sup>ème</sup> année = 0 %	<b>Keq P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b> : Coefficient d'équivalence engrais P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> minéral efficace Les Keq P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> de boues ou composts de boue varient en fonction de la fréquence d'apport.  <b>Si apport tous les ans (cas A) :</b> Keq P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 1 <sup>ère</sup> année = 100 % Keq P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 2 <sup>ème</sup> année = 0 % <b>Si apport tous les 2 ou 3 ans (cas B et C) :</b> Keq P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 1 <sup>ère</sup> année = valeurs données en <b>Annexe 5</b> . Keq P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 2 <sup>ème</sup> année = 0 %	<b>Keq K<sub>2</sub>O</b> : Coefficient d'équivalence engrais potasse minéral efficace = 100 %

### Préconisations du réseau des MESE d'Oc.

Dans l'attente de nouvelles références et par simplification, ne pas tenir compte des Keq N et Keq P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> de 2<sup>ème</sup> année dans le calcul de la fertilisation complémentaire.

## Fertilisation complémentaire pour l'année N

### Préconisations du réseau des MESE d'Oc.

Fournir un conseil de fertilisation complémentaire suite aux épandages de boues ou composts de boues. Accompagner le calcul d'un commentaire explicite sur la nécessité ou non d'apporter une fertilisation complémentaire pour l'année N, notamment en ce qui concerne les impasses de fertilisation en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.

Pour des doses de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ou K<sub>2</sub>O à apporter < à 20 kg/ha, réaliser une impasse.

### Fertilisation complémentaire pour l'année N à apporter par l'agriculteur (kg/ha) :

Dose prévisionnelle à apporter sur le cycle total de la culture - Dose finalement apportée par les boues



## Exemples

Les exemples de calculs présentés par la suite sont déclinés en fonction des cas de figures A et B et vont suivre la logique suivante :

- Doses en N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O à apporter ;
- Quantités de produit organique à apporter en fonction de chaque élément ;
- Quantité limitante de produit organique à apporter ;
- Dose d'éléments fertilisants finalement apportés par les boues ou composts de boues ;
- Fertilisation complémentaire pour l'année N ;
- Conclusion.

### 1. Rappels

#### a. Rappels des différents cas de figure des types d'apports en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O

Le réseau des MESE d'Oc. distingue 3 cas de figure en fonction de la fréquence des apports de boues ou composts de boues et de la couverture des doses en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O :

<b>Cas A</b>	Apport tous les ans en respectant les doses d'apport en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> et K <sub>2</sub> O pour l'année N
<b>Cas B</b>	Apport tous les 2 ans en respectant les doses d'apport en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> et K <sub>2</sub> O pour l'année N
<b>Cas C</b>	Dans l'attente de références et par simplification, possibilité d'un cas alternatif : apport tous les 2 ans en respectant les doses d'apport en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> et K <sub>2</sub> O pour les années N et N+1. L'azote est apporté pour l'année N uniquement.  <i>Hypothèse de simplification : la culture et le rendement de l'année N+1 sont identiques à ceux de l'année N (le coefficient multiplicatif ne change pas entre les années N et N+1 : il n'y a pas de nouvelles analyses de sol et le nombre d'impasses reste identique).</i>

#### Préconisations du réseau des MESE d'Oc.

Privilégier le cas A ou B. Le cas C doit rester exceptionnel et doit être justifié.

#### b. Rappel des données de l'exemple

Caractéristiques de la culture			
<b>Rotation</b>	Blé dur (N-1) / Maïs grain irrigué (N)		
<b>Gestion des résidus du blé dur (N-1)</b>	Pailles exportées chaque année Rendement de pailles réalisé : 3,5 t/ha		
<b>Rendement prévisionnel du maïs grain (N)</b>	Grains : 100 q/ha		
Teneurs du sol	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Joret-Hébert	K <sub>2</sub> O
<i>En mg/kg</i>	-	95	110
<b>Date de l'analyse de sol</b>	2015		

<b>Rappel de l'hypothèse prise par le réseau des MESE d'Oc.</b>	Pour la parcelle de référence, les teneurs du sol n'ont pas varié depuis 2015, même si elle a reçu des épandages depuis (ainsi que son groupe de parcelles).			
<b>Teneurs des boues</b>	<b>N</b>	<b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b>	<b>K<sub>2</sub>O</b>	<b>Matière sèche</b>
<i>En kg total/t MB</i>	13,6	8,8	0,83	19,9 %
<i>En kg total/t MS</i>	68,4	44,1	4,1	
<b>Keq 1<sup>ère</sup> année</b>	<b>N</b>	<b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b>	<b>K<sub>2</sub>O</b>	
<b>Cas A : Apport tous les ans en respectant les doses d'apport en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O pour l'année N</b>	0,4	1	1	
<b>Cas B : Apport tous les 2 ans en respectant les doses d'apport en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O pour l'année N</b>	0,4	0,7	1	
<b>Cas C : Apport tous les 2 ans en respectant les doses d'apport en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O pour les années N et N+1</b>	0,4	0,7	1	

## 2. Doses prévisionnelles à apporter par les boues

<i>En kg efficace/ha</i>	<b>N</b>	<b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b>	<b>K<sub>2</sub>O</b>
<i>Exemple du maïs grain avec un rendement de 100 q/ha</i>	Dose prévisionnelle à apporter sur le cycle total de la culture	Dose à apporter par les boues	
<b>Cas A : Apport tous les ans en respectant les doses d'apport en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O pour l'année N</b>	$(100 * 2,2 + 20 - 30 - 30 - 0 - 0 - 0) / 0,6 = 300$	<b>50</b>	$(0,8 \times 100 \times 0,6) + (3,5 \times 1,7) = 54$
<b>Cas B : Apport tous les 2 ans en respectant les doses d'apport en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O pour l'année N</b>	$(100 * 2,2 + 20 - 30 - 30 - 0 - 0 - 0) / 0,6 = 300$	<b>50</b>	$(1 \times 100 \times 0,55) + (3,5 \times 12,3) = 98$
			$(1,2 \times 100 \times 0,55) + (3,5 \times 12,3) = 109$

À noter que la différence de dose à apporter en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O entre les cas A et B provient du changement de coefficient multiplicatif des exportations (fonction de la fréquence d'apport).

## 3. Quantités de produit organique à apporter en fonction de chaque élément

	<b>N</b>	<b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b>	<b>K<sub>2</sub>O</b>	<b>N</b>	<b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b>	<b>K<sub>2</sub>O</b>
	<b>t MB/ha</b>			<b>t MS/ha</b>		
<b>Cas A : Apport tous les ans en respectant les doses d'apport en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O pour l'année N</b>	$50 / (13,6 \times 0,4) = 9,2$	$54 / (8,8 \times 1) = 6,1$	$98 / (0,83 \times 1) = 118,1$	$50 / (68,4 \times 0,4) = 1,8$	$54 / (44,1 \times 1) = 1,2$	$98 / (4,1 \times 1) = 23,9$
<b>Cas B : Apport tous les 2 ans en respectant les doses d'apport en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> et K<sub>2</sub>O pour l'année N</b>	$50 / (13,6 \times 0,4) = 9,2$	$66 / (8,8 \times 0,7) = 10,7$	$109 / (0,83 \times 1) = 131,3$	$50 / (68,4 \times 0,4) = 1,8$	$66 / (44,1 \times 0,7) = 2,1$	$109 / (4,1 \times 1) = 26,6$

À noter que pour P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, la différence de quantité à apporter entre les cas A et B provient du changement de Keq 1<sup>ère</sup> année.

## 4. Quantités finales retenues en fonction de l'élément limitant

	t MB/ha	t MS/ha	Élément limitant
Cas A : Apport tous les ans en respectant les doses d'apport en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> et K <sub>2</sub> O pour l'année N	6,1	1,2	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
Cas B : Apport tous les 2 ans en respectant les doses d'apport en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> et K <sub>2</sub> O pour l'année N	9,2	1,8	N

**Nota Bene** : l'élément limitant est l'élément qui doit conduire à limiter les apports. Cela impose un plafonnement de dose de cet élément limitant et entraîne un déficit sur les 2 autres (qui sera à compléter par fertilisation complémentaire).

Cet exemple met en évidence la difficulté à laquelle les gestionnaires d'épandages peuvent être confrontés dans le cas A : une quantité à épandre qui peut être en inadéquation avec les contraintes techniques d'épandage. Cela plaide donc en faveur d'un épandage tous les 2 ans afin d'avoir un coefficient multiplicatif des exportations et un Keq 1<sup>ère</sup> année du P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> plus favorable. Dans cet exemple, l'azote devient limitant dans le cas B.

## 5. Doses finalement apportées

Les calculs sont faits en utilisant les valeurs exprimées sur la matière brute. Les résultats sont arrondis à l'unité.

En kg efficace/ha	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
Cas A : Apport tous les ans en respectant les doses d'apport en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> et K <sub>2</sub> O pour l'année N	$6,1 \times 13,6 \times 0,4$ = 33	$6,1 \times 8,8 \times 1$ = 54	$6,1 \times 0,83 \times 1$ = 5
Cas B : Apport tous les 2 ans en respectant les doses d'apport en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> et K <sub>2</sub> O pour l'année N	$9,2 \times 13,6 \times 0,4$ = 50	$9,2 \times 8,8 \times 0,7$ = 57	$9,2 \times 0,83 \times 1$ = 8

## 6. Fertilisation complémentaire pour l'année N



En kg efficace/ha	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
Cas A : Apport tous les ans en respectant les doses d'apport en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> et K <sub>2</sub> O pour l'année N	300 - 33 = 267	54 - 54 = 0	98 - 5 = 93
Cas B : Apport tous les 2 ans en respectant les doses d'apport en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> et K <sub>2</sub> O pour l'année N	300 - 50 = 250	66-57 = 9	109 - 8 = 101

## 7. Conclusion

Avec les données de cet exemple, les cas A et B diffèrent peu en termes d'apports d'éléments fertilisants. Dans ces deux cas, la fertilisation complémentaire en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> devra être nulle en année N (c'est-à-dire, l'année suivant les épandages). A noter que pour des sols non carencés, le cas B est le plus intéressant car il permet d'éviter des apports annuels sur les parcelles en privilégiant une fréquence de retour des boues de deux ans. En outre, la dose plus élevée apportée dans le cas B tient davantage compte des contraintes techniques de l'épandage.

À noter que pour des sols non carencés, le gestionnaire d'épandage devra considérer l'intérêt de préconiser à l'agriculteur une impasse de fertilisation en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> en année N+1 (c'est-à-dire l'année où les boues ne sont pas épandues) afin de maximiser le coefficient multiplicatif des exportations et minimiser le Keq 1<sup>ère</sup> année du P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.

# Schéma de synthèse du raisonnement de la fertilisation du maïs



\* : Protocole repousses Directive Nitrates pour précédent « céréales à paille » si >75 plantes/m<sup>2</sup> au 23 septembre N-1, destruction des repousses possible à partir du premier novembre N-1  
 \*\*: Semence ou grain

## Liste bibliographique

### Textes réglementaires issus des Groupes Régionaux d'Expertise Nitrates (GREN)

*Arrêté préfectoral régional de Languedoc-Roussillon du 5 septembre 2012 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée en agriculture pour la région Languedoc-Roussillon.*

*Arrêté préfectoral régional de Midi-Pyrénées du 31 août 2015 n°20150831-311-278 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Midi-Pyrénées, modifié par l'arrêté du 29 décembre 2015.*

### Ouvrages

CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE LANGUEDOC-ROUSSILLON. (2011). *Les produits organiques utilisables en agriculture en Languedoc-Roussillon.*

### Rapports techniques

ARVALIS, Institut du végétal. (1995). *Teneurs-seuils pk par type de sol. Compléments au recueil de fiches "Les doses et les teneurs-seuils par région".*

COMIFER, Groupe P K Mg. (2007). *Teneurs en P, K et Mg des organes végétaux récoltés.*

COMIFER, Groupe P K Mg. (2009). *Grille de calcul de dose.*

## Annexes

<b>ANNEXE 1 : METHODES DE CALCUL DE LA DOSE PREVISIONNELLE D'AZOTE A UTILISER .....</b>	<b>312</b>
<b>ANNEXE 2 : LE BILAN AZOTE ET SES DIFFERENTS POSTES EN CULTURES ANNUELLES .....</b>	<b>34</b>
<b>ANNEXE 3: MODALITES DE CALCUL DE L'AZOTE MINERAL A L'OUVERTURE DU BILAN (RI) .....</b>	<b>36</b>
<b>ANNEXE 4 : COEFFICIENT D'EQUIVALENCE ENGRAIS AZOTE MINERAL EFFICACE (KEQ N) .....</b>	<b>44</b>
<b>ANNEXE 5 : COEFFICIENT D'ENGRAIS MINERAL EN PHOSPHORE (KEQ P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) .....</b>	<b>48</b>

## Annexe 1 : Méthodes de calcul de la dose prévisionnelle d'azote à utiliser

Cultures ou prairies	Méthode de calcul de la dose prévisionnelle d'azote	Période d'ouverture du bilan azoté	Références
Céréales d'hiver et de printemps	Bilan azoté Sud-Est	En début d'hiver (fin novembre – début décembre) Au plus tard au stade 3 feuilles	Annexe 1 – Arrêté préfectoral régional LR du 5/09/2012 n°120285
	Bilan azoté Sud-Ouest	Stade épi 1cm de la culture (1 <sup>er</sup> mars par convenance)	Annexe 2 – Arrêté préfectoral régional MP du 31/08/2015 n°20150831-311-278, modifié par l'arrêté du 29/12/2015
Maïs	Bilan azoté	Stade 4 feuilles (dans l'arrêté GREN Languedoc-Roussillon du 5 septembre 2012) Au semis, 1 <sup>er</sup> mai par convenance (dans l'arrêté GREN Midi-Pyrénées du 6 juin 2014)	Annexe 2 – Arrêté préfectoral régional LR du 5/09/2012 n°120285 Annexe 3 – Arrêté préfectoral régional MP du 31/08/2015 n°20150831-311-278, modifié par l'arrêté du 29/12/2015
	Sorgho grain : dose plafond fonction de : <ul style="list-style-type: none"> <li>du type de sol : superficiel/ profond</li> <li>du type de conduite de la culture : irriguée ou en sec</li> <li>des conditions pluviométriques de l'automne/hiver (octobre à mars)</li> </ul> <p><b>Le réseau des MESE d'Oc. considère que le raisonnement est le même pour le sorgho semence et qu'il faut utiliser la méthode ex-Midi-Pyrénées pour le sorgho fourrager.</b></p>	(sorgho grain) Annexe 7 – Arrêté préfectoral régional LR du 5/09/2012 n°120285 (sorgho fourrager) Annexe 3 – Arrêté préfectoral régional MP du 31/08/2015 n°20150831-311-278, modifié par l'arrêté du 29/12/2015	
Riz	Dose plafond et préconisation du Centre Français du Riz	-	Arrêté préfectoral régional LR du 5/09/2012 n°120285 Centre Français du Riz
Colza	Bilan azoté	Décembre-janvier Au plus tard au 31 janvier	Annexe 3 – Arrêté préfectoral régional LR du 5/09/2012 n°120285
Tournesol	Dose plafond	Au plus tard au semis (mars-avril)	Annexe 6 – Arrêté préfectoral régional LR du 5/09/2012 n°120285
Prairies	Bilan azoté	Avant le premier apport (fin d'hiver)	Annexe 4 – Arrêté préfectoral régional LR du 5/09/2012 n°120285 Annexe 5 – Arrêté préfectoral régional MP du 31/08/2015 n°20150831-311-278, modifié par l'arrêté du 29/12/2015



<b>Vigne</b>	<p>Dose plafond fonction de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• du type de production</li> <li>• la vigueur</li> </ul> <p>l'entretien annuel des inter-rangs</p>	<p>Avant le premier apport d'engrais minéraux (généralement mars)</p>	<p>Annexe 9 – Arrêté préfectoral régional LR du 5/09/2012 n°120285</p>
<b>Arboriculture</b>	<p>Dose plafond fonction de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'âge du verger</li> <li>• la vigueur du jeune verger/ oliveraie</li> </ul> <p>du potentiel de rendement pour le verger ou l'oliveraie adulte</p>	<p>Au plus tard au moment de la reprise de végétation (31 mars)</p>	<p>Annexe 8 – Arrêté préfectoral régional LR du 5/09/2012 n°120285</p>

## Annexe 2 : Le bilan azoté et ses différents postes en cultures annuelles

### 1 • Les équations du bilan prévisionnel

Le concept de bilan d'azote minéral du sol prévisionnel développé par Hébert en 1969 puis Rémy-Hébert en 1974 s'est progressivement imposé en France comme la méthode de raisonnement de la fertilisation azotée des cultures.

De nombreux travaux lui ont été consacrés en vue d'améliorer sans cesse son paramétrage.

### 2 • Le bilan de l'azote minéral dans le sol, résultante des flux d'azote

Sur une période de temps donnée, le bilan de masse du stock d'azote minéral du sol sur la profondeur explorée par les racines de la culture s'écrit :

$$\text{Etat final} - \text{Etat initial} = \text{Entrées} - \text{Sorties}$$

$$[1] : R_f - R_i = [M_h + F_s + F_{ns} + M_{hp} + M_r + M_{rCi} + M_{pro1} + M_{pro2} + A + N_{irr} + X + X_{pro}] - [P_f - P_i + I_x + G_s + G_x + L]$$

Avec :

Etats initial et final	
R <sub>f</sub>	Quantité d'azote minéral dans le sol à la fermeture du bilan
R <sub>i</sub>	Quantité d'azote minéral dans le sol à l'ouverture du bilan
Entrée d'azote dans le système sol-plante	
M <sub>h</sub>	Minéralisation nette de l'humus du sol
F <sub>s</sub>	Fixation symbiotique d'azote atmosphérique par la culture
F <sub>ns</sub>	Fixation non symbiotique d'azote atmosphérique
M <sub>hp</sub>	Minéralisation nette due à un retournement de prairie
M <sub>r</sub>	Minéralisation nette de résidus de récolte
M <sub>rCi</sub>	Minéralisation nette de résidus de culture intermédiaire
M <sub>pro1</sub>	Minéralisation nette de l'azote organique d'un PRO n°1 apporté avant l'ouverture du bilan
M <sub>pro2</sub>	Minéralisation nette de l'azote organique d'un PRO n°2 apporté après l'ouverture du bilan
A	Apports atmosphériques (apports météoriques = dépôts secs ou humides)
N <sub>irr</sub>	Azote apporté par l'eau d'irrigation
X	Apport d'azote sous forme d'engrais minéral de synthèse
X <sub>pro</sub>	Azote de la fraction minérale d'un PRO apporté après la date d'ouverture du bilan
Sorties d'azote du système sol-plante	
P <sub>f</sub>	Quantité d'azote absorbé par la culture à la fermeture du bilan
P <sub>i</sub>	Quantité d'azote absorbé par la culture à l'ouverture du bilan
I <sub>x</sub>	Organisation par voie microbienne aux dépens de l'azote minéral apporté sous forme d'engrais de synthèse ou de fraction minérale du PRO
G <sub>s</sub>	Pertes du sol par voie gazeuse (dénitrification pour l'essentiel)
G <sub>x</sub>	Perte par voie gazeuse (volatilisation, dénitrification) aux dépens de l'engrais minéral (X) et de la fraction minérale du PRO apporté après l'ouverture du bilan (X <sub>pro</sub> )
L	Pertes par lixiviation du nitrate pendant l'ouverture du bilan

### 3 • Les écritures opérationnelles du bilan

Plusieurs simplifications sont usuellement apportées à l'équation [1] sur une période correspondant à un cycle cultural en situation de prélèvement intense d'azote par la culture :

- On considère que les pertes du sol par voies gazeuses et la fixation non symbiotique sont des phénomènes de faible ampleur et du même ordre de grandeur d'où le postulat :  $G_s = F_{ns}$ .
- La méthode du bilan prévisionnel s'applique dans la quasi-totalité des situations à des cultures non-légumineuses, d'où  $F_s = 0$ .

L'équation [1] devient l'équation [4.]

#### a. Écriture simplifiée de l'équation du bilan azoté (Equation [4] du COMIFER)

$$X = ([Pf + Rf] - [Pi + Ri + Mh + Mhp + Mr + MrCi + Nirr]) / CAU - Xa$$

Avec :

X : Apport d'azote sous forme d'engrais minéral de synthèse

Pf : Quantité d'azote absorbé par la culture à la fermeture du bilan

Rf : Quantité d'azote minéral dans le sol à la fermeture du bilan (ou reliquat azoté final)

Pi : Quantité d'azote absorbé par la culture à l'ouverture du bilan

Ri : Quantité d'azote minéral dans le sol à l'ouverture du bilan (ou reliquat azoté initial)

Mh : Minéralisation nette de l'humus du sol

Mhp : Minéralisation nette due à un retournement de prairie

Mr : Minéralisation nette de résidus de récolte

MrCi : Minéralisation nette de résidus de culture intermédiaire

Nirr : Azote apporté par l'eau d'irrigation

CAU : Coefficient Apparent d'Utilisation de l'engrais

Xa : Equivalent engrais minéral efficace d'un produit organique

#### b. Maïs : Écriture simplifiée du bilan

**Formule pour maïs (méthode ARVALIS intégrée dans l'arrêté régional de Languedoc-Roussillon du 5 septembre 2012 n°120285 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée en agriculture.)**

$$X + Xa = ([Pf + Rf] - [Ri + Mh + Mhp + MrCi + Nirr]) / CAU$$

Avec :

$X + Xa$  = dose totale d'azote efficace à apporter sur le bilan azoté, **mais dans l'attente de références, le réseau des MESE d'Oc. considère que cette dose totale couvre le cycle total de la culture.**

Le paramètre Pi est comptabilisé dans le paramètre Ri calculé dans la méthode Sud-Ouest.

Le paramètre Mr est comptabilisé dans un cas de figure du Ri.

**Formule pour maïs (méthode ARVALIS récente intégrée dans l'arrêté préfectoral régional de Midi-Pyrénées du 31 août 2015 n°20150831-311-278 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Midi-Pyrénées, modifié par l'arrêté du 29 décembre 2015.)**

$$X + Xa = ([Pf + Rf] - [Ri + Mh + Mhp + Mr + MrCi + Nirr]) / CAU$$

Avec :

$X + Xa$  = dose totale d'azote efficace à apporter sur le bilan azoté, **mais dans l'attente de références, le réseau des MESE d'Oc. considère que cette dose totale couvre le cycle total de la culture.**

Le paramètre Pi est comptabilisé dans le paramètre Ri calculé dans la méthode Sud-Ouest.

Source : Calcul de la fertilisation azotée, Guide méthodologique pour l'établissement des prescriptions locales pour cultures annuelles et prairies – Comifer, groupe Azote (2013)

## Annexe 3: Modalités de calcul de l'azote minéral à l'ouverture du bilan (Ri)

Date d'ouverture du bilan azoté du précédent : au plus tard à la date de semis de la culture du précédent.

Plusieurs cas sont possibles en fonction de la nature du précédent :

- Cas 1 : précédent autre que légumineuses et prairies
- Cas 2 : légumineuses
- Cas 3 : prairie ou jachère
- Cas 4 : culture intermédiaire.

### ■ Cas 1 : Précédent autre que légumineuses et prairies

**Ri** = APL - Lixiviation hivernale + Minéralisation hivernale de l'humus avant ouverture du bilan du maïs.

Avec APL : Azote Potentiellement Lixivable = quantité d'azote minéral présent dans le sol à l'entrée de l'hiver, dépendant de la nature du précédent et susceptible d'être lixivité.

► Calcul de l'APL

$$\text{APL} = (\text{A} + \text{Am} + \text{Ao} + \text{MhpPrécédent} + \text{MrCiPrécédent} - \text{Azote consommé par le précédent}) \times \text{Coeff de correction d'un excès d'azote du bilan de la culture précédente} + \text{Azote organique apporté avant ouverture du bilan}$$

Tableau 25.

Tableau 25 : Calcul de l'APL

	Calcul des valeurs
<p>① <b>A</b> Azote fourni à la culture précédente par la minéralisation kg N/ha</p>	<p>Avec A : valeur annuelle publiée dans l'arrêté complémentaire au 1<sup>er</sup> février de chaque année. Elle est valable pour toute la région ex-Midi-Pyrénées et par simplification dans l'attente de références pour le territoire Languedoc-Roussillon (préconisations du réseau des MESE d'Oc.). En l'absence de données, se reporter au <b>Tableau 26</b>.</p> <p>Pour information, la formule de calcul :  <math>A = 0,102 \times \text{somme (ETP}^* - P) + 0,073 \times \text{somme de T}^\circ - 170</math>            Cette relation statistique a été établie et ne peut être utilisée qu'à partir des données météo de la station de <b>Toulouse Blagnac</b>. Elle est validée annuellement par un réseau régional de reliquat à l'entrée de l'hiver avant le début de la lixiviation hivernale.</p>
<p>② <b>Am</b> Azote minéral apporté au précédent kg N/ha</p>	<p>D'après le cahier d'épandage de l'agriculteur</p>
<p>③ <b>Ao</b> Apport d'azote organique au précédent kg N/ha</p>	<p>Equivalent engrais minéral azote organique <u>apporté au précédent</u>  <math>= \% N_{\text{tot}} \times Q</math> (quantité totale apportée d'après déclaration de l'agriculteur) x Keq N sur cycle de la culture précédente            Keq N sur cycle de la culture précédente donné en <b>Annexe 4</b>.</p>
<p>④ <b>Mhp Précédent</b> Effet d'un retournement de prairie avant le précédent kg N/ha</p>	<p>Prendre la valeur Mhp du <b>Tableau 27</b>.</p>
<p>⑤ <b>MrCi Précédent</b> Contribution d'une culture intermédiaire avant le précédent kg N/ha</p>	<p>Prendre la valeur MrCi du <b>Tableau 28</b>.</p>
<p>⑥ <b>Azote consommé par le précédent</b> kg N/ha</p>	<p>N consommé par le précédent = rendement réalisé déclaré par l'agriculteur x N absorbé par unité de production</p> <p>Prendre les valeurs de N absorbé par unité de production du précédent dans le <b>Tableau 29</b>.</p>
<p>⑦ <b>Coefficient de correction d'un excès d'azote du bilan de la culture précédente</b></p>	<p>Pour intégrer les effets d'excès de bilan du précédent, la quantité d'azote disponible après la récolte du précédent doit être multipliée par les coefficients suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si précédent = céréales, prendre 0,27</li> <li>- Si précédent = maïs, sorgho, prendre 0,48</li> <li>- Si précédent = autres cultures que céréales, maïs et sorgho, prendre 0,4.</li> </ul>

Calcul des valeurs	
	<b>Source : Tableau 5 de l'annexe 16 de l'arrêté préfectoral régional de Midi-Pyrénées du 31 août 2015 n°20150831-311-278 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Midi-Pyrénées, modifié par l'arrêté du 29 décembre 2015.</b>
⑧ Azote organique apporté avant ouverture du bilan du précédent kg N/ha	Equivalent engrais minéral d'un produit organique apporté à l'automne = % N <sub>tot</sub> x Q (quantité totale apportée) x Keq N  Keq N du produit organique apporté <u>avant ouverture du bilan</u> du précédent donné en <b>Annexe 4</b> .
APL Azote Potentiellement Lixivable kg N/ha	$APL = [① + ② + ③ + ④ + ⑤] - ⑥ \times ⑦ + ⑧$

Tableau 26 : Valeur de A, azote fourni à la culture précédente par la minéralisation

Conditions climatiques de l'année précédente	A kg N/ha
Printemps et été chauds	140
Année normale	100
Année froide avec été pluvieux	60

Source : Annexe 2 de l'arrêté préfectoral régional de Languedoc-Roussillon du 5 septembre 2012 n°120285 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée en agriculture.

Tableau 27 : Minéralisation nette due à un retournement de prairie (Mhp) pour le maïs (en kg N/ha)

Type de production de prairies	Mode d'exploitation	Age de la prairie			
		< 18 mois	2 - 3 ans	4 - 5 ans	6 - 10 ans
Graminées + légumineuses	Pâturage				
	Pâturage + Fauche	20	60	100	120
	Fauche uniquement				
Graminées pures	Pâturage (= pâturage intégral)	20	60	100	120
	Pâturage + Fauche	14	42	70	84
	Fauche uniquement (= fauche intégrale)	8	24	40	48

Source : Annexe 3 de l'arrêté préfectoral régional de Midi-Pyrénées du 31 août 2015 n°20150831-311-278 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Midi-Pyrénées, modifié par l'arrêté du 29 décembre 2015.

**Nota Bene** : il n'y a pas d'effet azote lorsque la prairie est retournée à l'automne précédent une culture d'été.

Tableau 28 : Minéralisation nette de résidus de cultures intermédiaires (MrCi)

Type de culture intermédiaire	Production de la culture intermédiaire t MS/ha	Ouverture du bilan au semis du maïs
		Destruction avant semis du maïs (novembre/décembre) kg N/ha
Crucifères (moutarde, radis ...)	≤ 1	0
	2 (> 1 et < 3)	5
	≥ 3	10
Graminées de type seigle, avoine	≤ 1	0
	2 (> 1 et < 3)	0
	≥ 3	5

Type de culture intermédiaire	Production de la culture intermédiaire t MS/ha	Ouverture du bilan au semis du maïs
		Destruction avant semis du maïs (novembre/décembre) kg N/ha
Graminées de type ray-grass	≤ 1	0
	2 (> 1 et < 3)	5
	≥ 3	10
Légumineuses	≤ 1	5
	2 (> 1 et < 3)	10
	≥ 3	20
Hydrophyllacées (Phacélie)	≤ 1	0
	2 (> 1 et < 3)	0
	≥ 3	5
Mélanges graminée/ légumineuses	≤ 1	3
	2 (> 1 et < 3)	5
	≥ 3	13
Mélanges crucifères/ légumineuses	≤ 1	3
	2 (> 1 et < 3)	8
	≥ 3	15

Source : Annexe 3 de l'arrêté préfectoral régional de Midi-Pyrénées du 31 août 2015 n°20150831-311-278 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Midi-Pyrénées, modifié par l'arrêté du 29 décembre 2015.

Tableau 29 : Azote absorbé par unité de rendement par le précédent

Précédent	Azote absorbé par unité de rendement du précédent kg N/q ou t MS
Ouverture du bilan en sortie d'hiver	
Avoine (printemps et hiver) pailles enlevées	2,5
Avoine (printemps et hiver) pailles restituées	2,8
Blé tendre pailles enlevées	3
Blé tendre pailles restituées	3,3
Blé dur pailles enlevées	3,7
Blé dur pailles restituées	4
Colza	6
Maïs doux épis + spathes	10
Maïs doux épis dépouillés	12
Maïs fourrage	12
Maïs grain	2,5
Maïs semence	5,7
Orge (hiver ou printemps) pailles enlevées	2,5
Orge (hiver ou printemps) pailles restituées	2,8
Seigle pailles enlevées	2,3
Seigle pailles restituées	2,6
Sorgho ensilage	13
Sorgho grain	2,8
Tournesol	4
Triticale pailles enlevées	2,6
Triticale pailles restituées	2,9
Pois	0
Féverole	0
Lupin	0
Soja	0
Prairie	0
Culture intermédiaire	0

Précédent	Azote absorbé par unité de rendement du précédent kg N/q ou t MS
Ouverture du bilan en sortie d'hiver	
Luzerne (retournement fin été/début automne) : âge de la luzerne 2 ans	0
Luzerne (retournement fin été/début automne) : âge de la luzerne 3 ans	0
Luzerne (retournement printemps)	0
Betterave	220 kg/ha
Carotte	100 à 165 kg/ha (suivant cycle)
Endive	90 à 185 kg/ha (suivant variété)
Pommes de terre	100 à 250 kg/ha (suivant date plantation)
Cultures cynégétiques (mélange graminées/légumineuses ou graminées pures)	3 (préconisation du réseau des MESE d'Oc., en l'absence de références)

Source : Tableau 4-a de l'annexe 16 de l'arrêté préfectoral régional de Midi-Pyrénées du 31 août 2015 n°20150831-311-278 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Midi-Pyrénées, modifié par l'arrêté du 29 décembre 2015.

### ► Estimation de Ri à partir de l'APL et du cumul de pluie hivernale

#### Préconisations du réseau des MESE d'Oc.

La lixiviation hivernale et la minéralisation nette hivernale de l'humus ont été modélisées pour les types de sol de la région ex-Midi-Pyrénées, qui seront prises comme références pour la région ex-Languedoc-Roussillon, dans l'attente de nouvelles références.

L'estimation du terme Ri se fait en utilisant les abaques de Ri pour chaque type de sol du territoire Midi-Pyrénées en fonction :

- de l'APL calculé (en kg d'azote/ha),
- du cumul de pluie hivernale entre le 01/10 et le 01/05 (en mm). (cf. **Tableau 30**).

**Tableau 30. Estimation de Ri à partir de l'APL et du cumul de pluie hivernale dans le bilan azoté du maïs**

Ri (Cultures d'été) en kg N/ha	APL = Azote Potentiellement Lixivable en kg N/ha	Cumul de pluie entre le 01/10 et le 01/05 (en mm)								
		250	300	350	400	450	500	600	700	800
Alluvions argilo-limoneuses à argileuses / Alluvions limoneuses à argilo- limoneuses : Sols N°3 et 4	0	45	45	45	45	42	40	36	31	25
	20	60	60	60	53	48	43	37	31	25
	40	76	76	76	62	54	47	38	31	25
	60	92	92	92	73	61	52	39	31	25
	80	107	107	107	86	69	56	40	31	25
	100	123	123	123	102	78	62	41	31	25
	120	138	138	138	120	88	67	42	31	25
	140	154	154	154	142	100	73	43	31	25
Argilo-calcaïque : Sols N° 16	0	40	40	40	39	37	35	31	29	27
	20	56	56	56	48	43	39	32	29	27
	40	73	73	73	58	50	43	33	29	27
	60	89	89	89	71	57	47	34	29	27
	80	106	106	106	86	66	53	35	29	27
	100	122	122	122	105	77	58	36	29	27
	120	139	139	139	127	89	65	37	29	27
	140	155	155	155	154	103	72	38	29	27
Bouillonne superficielle / Bouillonne moyenne : Sols N° 10 et 12	0	46	46	46	44	41	39	35	29	25
	20	62	62	62	51	46	41	35	29	25
	40	79	79	79	59	51	44	35	29	25
	60	96	96	96	68	56	47	36	29	25
	80	112	112	112	78	62	51	36	29	25



Ri (Cultures d'été) en kg N/ha	APL = Azote Potentiellement Lixiviable en kg N/ha	Cumul de pluie entre le 01/10 et le 01/05 (en mm)								
		250	300	350	400	450	500	600	700	800
	100	129	129	129	90	69	54	36	29	25
	120	146	146	146	103	76	58	36	29	25
	140	162	162	162	119	84	62	37	29	25
Boulbène profonde : Sol N°11	0	44	44	44	41	39	36	32	28	24
	20	59	59	59	47	42	38	32	28	24
	40	74	74	74	53	45	39	32	28	24
	60	89	89	89	60	49	41	32	28	24
	80	104	104	104	68	53	42	32	28	24
	100	120	120	120	77	57	44	32	28	24
	140	135	135	135	87	62	46	32	28	24
Argileux acides à cailloux / Argilo-acides Sols N° 17 et 21	0	34	34	34	34	34	32	29	27	25
	20	47	47	47	47	42	39	33	29	26
	40	65	65	65	65	53	47	38	31	27
	60	82	82	82	82	66	57	43	34	28
	80	99	99	99	99	83	68	49	37	29
	100	116	116	116	116	104	83	56	40	30
	140	133	133	133	133	130	100	64	44	31
Boulbène caillouteuse superficielle / Alluvions caillouteuses / Ségala à faible MO Sols N° 9, 1 et 22	0	37	33	30	27	25	23	20	18	16
	20	55	39	33	28	24	23	20	18	16
	40	72	47	36	29	24	23	20	18	16
	60	90	55	40	30	23	23	20	18	16
	80	108	66	44	31	23	23	20	18	16
	100	125	78	49	32	23	23	20	18	16
	140	143	92	54	33	22	22	20	18	16
Alluvions sableuses / Alluvions sableuses calcaires Sols N° 2 et 6	0	38	34	31	29	27	24	21	18	16
	20	47	39	34	30	27	24	21	18	16
	40	58	46	38	32	27	24	21	18	16
	60	72	53	42	34	28	24	21	18	16
	80	89	62	46	36	28	24	21	18	16
	100	110	72	51	38	29	24	21	18	16
	140	136	84	56	40	29	24	21	18	16
Ségala à MO élevé Sol N° 19	0	49	49	45	40	36	33	26	20	17
	20	66	66	51	44	38	33	26	20	17
	40	83	83	58	48	40	34	26	20	17
	60	100	100	67	52	42	34	26	20	17
	80	117	117	76	57	44	35	26	20	17
	100	134	134	86	62	46	35	26	20	17
	140	151	151	99	67	48	36	26	20	17
Argilo-calcaire profond Sol N° 14	0	32	32	32	31	30	28	24	21	19
	20	49	49	49	41	36	32	26	22	19
	40	66	66	66	51	43	37	28	23	19
	60	83	83	83	63	51	43	31	24	19
	80	100	100	100	78	61	49	34	25	19
	100	117	117	117	96	73	57	37	26	19
	140	134	134	134	119	87	66	41	27	19
Argilo-calcaire superficiel / Alluvions caillouteuses calcaires Sols N° 13 et 5	0	31	31	31	31	30	27	23	21	18
	20	48	48	48	48	37	32	26	22	18
	40	65	65	65	65	45	38	29	23	18
	60	82	82	82	82	56	45	32	24	18
	80	98	98	98	98	69	54	35	25	18
	100	115	115	115	115	84	64	39	26	18
	140	132	132	132	132	104	76	44	27	18
Argilo-calcaire moyen / Argilo-calcaire à cailloux	0	30	30	30	30	27	25	21	19	17
	20	45	45	45	35	30	27	21	19	17

Ri (Cultures d'été) en kg N/ha	APL = Azote Potentiellement Lixivable en kg N/ha	Cumul de pluie entre le 01/10 et le 01/05 (en mm)								
		250	300	350	400	450	500	600	700	800
Sols N° 15 et 20	40	61	61	61	41	34	28	21	19	17
	60	77	77	77	48	37	30	21	19	17
	80	93	93	93	56	42	32	21	19	17
	100	109	109	109	65	47	34	21	19	17
	120	125	125	125	76	52	37	20	19	17
	140	140	140	140	89	58	39	20	19	17
Alluvions argilo-limoneuses à argileuses calcaires / Alluvions limoneuses à limono argileuses calcaires Sols N° 7 et 8	0	28	28	28	28	28	26	23	21	19
	20	45	45	45	38	34	30	25	21	19
	40	62	62	62	48	41	35	27	21	19
	60	79	79	79	60	49	41	30	21	19
	80	95	95	95	76	59	47	32	21	19
	100	112	112	112	95	71	55	35	21	19
	120	129	129	129	119	86	64	38	21	19
140	146	146	146	136	103	74	42	21	19	
Sols de Causses Sol N° 18	0	20	20	19	19	18	17	15	13	12
	20	27	24	21	20	18	17	15	13	12
	40	36	29	24	21	18	17	15	13	12
	60	47	35	27	22	18	17	15	13	12
	80	63	42	30	23	18	17	15	13	12
	100	83	51	34	24	18	17	15	13	12
	120	110	62	38	25	17	17	15	13	12
	140	146	75	43	27	17	17	15	13	12

Source : Tableau 7 de l'annexe 16 de l'arrêté préfectoral régional de Midi-Pyrénées du 31 août 2015 n°20150831-311-278 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Midi-Pyrénées, modifié par l'arrêté du 29 décembre 2015.

### ■ Cas 2 : Précédent légumineuses

**Ri** = APL - Lixiviation hivernale + Minéralisation hivernale de l'humus avant ouverture du bilan du maïs.

Avec APL : Azote Potentiellement Lixivable = quantité d'azote minéral présent dans le sol à l'entrée de l'hiver, dépendant de la nature du précédent et susceptible d'être lixivie.

#### ► Calcul de l'APL

Tableau 31 : APL dans le cas d'un précédent légumineuses

Type de précédent à base de légumineuses	APL kg N/ha	Valeur de A Azote fourni à la culture précédente par la minéralisation kg N/ha
<b>Pois</b>	$30 + 0,5 \times A$	<p><b>Avec A : valeur annuelle publiée dans l'arrêté complémentaire au 1<sup>er</sup> février de chaque année.</b></p> <p><b>Elle est valable pour toute la région ex-Midi-Pyrénées</b> et par simplification dans l'attente de références pour le territoire Languedoc-Roussillon (préconisations du réseau des MESE d'Oc.). En l'absence de données, se reporter au Tableau 26.</p> <p>Pour information, la formule de calcul :</p> <p><math>A = 0,102 \times \text{somme (ETP}^* - P) + 0,073 \times \text{somme de T}^\circ - 170</math></p> <p>Cette relation statistique a été établie et ne peut être utilisée qu'à partir des données météo de la station de <b>Toulouse Blagnac</b>. Elle est validée annuellement par un réseau régional de reliquat à l'entrée de l'hiver avant le début de la lixiviation hivernale.</p>
<b>Féverole Lupin</b>	$20 + 0,4 \times A$	
<b>Soja</b>	$20 + 0,3 \times A$	

Source : Tableau 4 de l'annexe 3 de l'arrêté préfectoral régional de Midi-Pyrénées du 31 août 2015 n°20150831-311-278 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Midi-Pyrénées, modifié par l'arrêté du 29 décembre 2015.

► Estimation de Ri à partir de l'APL et du cumul de pluie hivernale entre le 01/10 et le 01/05  
Idem au cas A (cf. Tableau 30).

### ■ Cas 3 : Précédent prairie ou jachère

**Ri** = APL - Lixiviation hivernale + Minéralisation hivernale de l'humus avant ouverture du bilan du maïs.

Avec APL : Azote Potentiellement Lixivable = quantité d'azote minéral présent dans le sol à l'entrée de l'hiver, dépendant de la nature du précédent et susceptible d'être lixivie.

Dans ce cas, on considère que la prairie est retournée au printemps, la lixiviation hivernale est donc nulle.

Le Ri est estimé directement dans le **Tableau 32**.

**Tableau 32 : Ri dans le cas d'un précédent prairie ou jachère**

Précédent : prairie ou jachère	Formule du Ri kg N/ha	Valeurs de kp pour les prairies		Ri simplifié kg N/ha	Valeur de A Azote fourni à la culture précédente par la minéralisation kg N/ha
Prairie de 1 à 2 ans	25 x kp+ (0,3 x A)	Prairie toujours pâturée ou Associations graminées + légumineuses	kp = 1	25 + (0,3 x A)	<p><b>Avec A : valeur annuelle publiée dans l'arrêté complémentaire au 1<sup>er</sup> février de chaque année. Elle est valable pour toute la région ex-Midi-Pyrénées et par simplification dans l'attente de références pour le territoire Languedoc-Roussillon (préconisations du réseau des MESE d'Oc.). En l'absence de données, se reporter au Tableau 26.</b></p> <p>Pour information, la formule de calcul : A = 0,102 x somme (ETP* - P) + 0,073 x somme de T° - 170</p> <p>Cette relation statistique a été établie et ne peut être utilisée qu'à partir des données météo de la station de <b>Toulouse Blagnac</b>. Elle est validée annuellement par un réseau régional de reliquat à l'entrée de l'hiver avant le début de la lixiviation hivernale.</p>
		Prairie fauchée et pâturée	kp = 0,7	17,5 + (0,3 x A)	
		Prairie toujours fauchée	kp = 0,4	10 + (0,3 x A)	
Prairie de 3 à 6 ans	75 x kp+ (0,3 x A)	Prairie toujours pâturée ou Associations graminées + légumineuses	kp = 1	75 + (0,3 x A)	
		Prairie fauchée et pâturée	kp = 0,7	52,5 + (0,3 x A)	
		Prairie toujours fauchée	kp = 0,4	30 + (0,3 x A)	
Prairie de plus de 6 ans	100 x kp+ (0,3 x A)	Prairie toujours pâturée ou Associations graminées + légumineuses	kp = 1	100 + (0,3 x A)	
		Prairie fauchée et pâturée	kp = 0,7	70 + (0,3 x A)	
		Prairie toujours fauchée	kp = 0,4	40 + (0,3 x A)	
Jachère annuelle de graminées	10 + (0,4 x A)			10 + (0,4 x A)	
Jachère annuelle de légumineuses Jachère pluriannuelle	20 + (0,4 x A)			20+ (0,4 x A)	

Source : Tableau 5 de l'annexe 3 de l'arrêté préfectoral régional de Midi-Pyrénées du 31 août 2015 n°20150831-311-278 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Midi-Pyrénées, modifié par l'arrêté du 29 décembre 2015.

### Cas 4 : Précédent culture intermédiaire

**Ri** = APL - Lixiviation hivernale + Minéralisation hivernale de l'humus avant ouverture du bilan du maïs.

Avec APL : Azote Potentiellement Lixivable = quantité d'azote minéral présent dans le sol à l'entrée de l'hiver, dépendant de la nature du précédent et susceptible d'être lixivie.

Dans ce cas, on n'applique pas non plus de lixiviation hivernale, l'azote présent dans le sol après une culture intermédiaire est fonction du type de sol.

Ri est donné directement par le **Tableau 33**.

**Tableau 33 : Ri dans le cas d'une culture intermédiaire**

Type de sol en Midi-Pyrénées		Argile %	CaCO <sub>3</sub> %	MO %	Cailloux %	Ri Azote dans le sol après une culture intermédiaire kg N/ha
N° de sol	Nom vernaculaire					
1	Alluvions caillouteuses	20	0	1,5	25	8
2	Alluvions sableuses	10	0	1,5	0	8
3	Alluvions limoneuses à limono argileuses	20	0	1,5	0	15
4	Alluvions argilo-limoneuses à argileuses	35	0	1,7	0	15
5	Alluvions caillouteuses calcaires	20	20	1,5	25	8
6	Alluvions sableuses calcaires	10	20	1,5	0	8
7	Alluvions limoneuses à limono argileuses calcaires	20	20	1,5	0	15
8	Alluvions argilo-limoneuses à argileuses calcaires	35	20	1,7	0	15
9	Boulbène caillouteuse superficielle	15	0	1,5	25	10
10	Boulbène superficielle	15	0	1,5	0	15
11	Boulbène profonde	15	0	1,5	0	20
12	Boulbène moyenne	15	0	1,5	0	15
13	Argilo-calcaire superficiel (rendosols)	30	20	1,5	0	15
14	Argilo-calcaire profond (calcosols)	33	10	1,7	0	20
15	Argilo-calcaire moyen (calcosols)	33	10	1,6	0	15
16	Argilo-calcaires (calcisols)	35	0	2	0	15
17	Argilo-acides (brunisol)	30	0	2	5	15
18	Sols des Causses	30	10	2	30	15
19	Ségala (sols acides limono-sableux à limono-argilo-sableux, MO élevé)	20	0	3	20	15
20	Argilo calcaires à cailloux	30	25	1,5	25	15
21	Argileux acides à cailloux	30	0	1,5	25	15
22	Ségala (sols acides limono-sableux à limono-argilo-sableux, faible MO)	20	0	1,8	20	15

Source : Tableau 8 de l'annexe 16 de l'arrêté préfectoral régional de Midi-Pyrénées du 31 août 2015 n°20150831-311-278 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Midi-Pyrénées, modifié par l'arrêté du 29 décembre 2015.

## Exemples de calculs du Ri

**Tableau 34 : Exemples de calcul du Ri**

	Cas 1	Cas 2	Cas 3	Cas 4
Hypothèses	Sol argilo-calcaire profond. Pluviosité entre le 1er octobre et le 30 avril = 400 mm Conditions climatiques de l'année précédente : Année normale			
	Précédent Blé dur pailles exportées, rendement 50 q/ha avec un apport de 100 kg d'azote minéral.	Précédent : Pois	Prairie de 1 à 2 ans, fauchée et pâturée.	
APL Reliquat d'azote au 1er octobre kg N/ha	$APL = \frac{[(1) + (2) + (3) + ((4) \text{ ou } (5)) - (6)]}{/ \times (7) + (8)}$ $APL = [100 + 100 + 0 + 0 \text{ ou } 0 - (3,7 \times 50)] \times 0,27 + 0$ <p style="text-align: center;"><b>APL = 4,05</b></p>	$APL = 30 + 0,5 \times 100$ <p style="text-align: center;"><b>APL = 80</b></p>		
Ri kg N/ha	<b>33</b>	<b>78</b>	$Ri = 25 \times 0,7 + 0,3 \times 100$ <p style="text-align: center;"><b>Ri = 47,5</b></p>	<b>Ri = 20</b>

## Annexe 4 : Coefficient d'équivalence engrais azote minéral efficace (Keq N)

Sont renseignées les valeurs de Keq cycle (et non celles de Keq bilan). La différence entre ces 2 valeurs est souvent assez minime et par ailleurs les anciennes références concernent le Keq cycle.

Une boue digérée = méthanisée au cours du processus de traitement des boues et non un digestat de boues.

Types de boues		Coefficients d'équivalence engrais azote minéral efficace (Keq N) préconisés par le réseau des MESE d'Occ. : fonction de la culture et de la période d'apport											
		Colza (culture d'hiver <sup>1</sup> )		Cultures d'hiver : Céréales, Oléagineux		Cultures de printemps : Céréales, Oléagineux (ex : Blé, orge, avoine)		Prairies		Amandier, abricotier, olivier		Viticulture	
Fin été/automne		Fin été/automne	Fin été/automne	Sortie hiver/printemps	Fin d'été/automne avant CIPAN (ex : maïs)	Été/automne (ex : maïs)	Printemps <sup>2</sup> (ex : sorgho, riz, tournesol)	Automne/hiver	Printemps	Automne/hiver	Printemps	Automne/hiver	Printemps
Boues activées	Boues activées liquides urbaines (C/N = 4,9)	0,37	0,25	0,4	0,35	0,35	0,45	automne : 0,3 sortie hiver : 0,45	0,35	0,3	0,45	0,3	0,45
	Boues activées liquides égouttées urbaines (C/N = 4,9)	0,1	0,1	0,35	0,15	0,15	0,45	0,25	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Boues activées filtre presse non chaufées (C/N = 5,9)	0,45	0,25	0,25	0,35	0,35	0,45	0,4	0,4	0,35	0,4	0,35	0,4
	Boues activées filtre presse chaufées (C/N = 5,9)	0,45	0,25	0,25	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Boues activées pâteuses filtre à	0,4	0,2	0,3	0,35	0,35	0,4	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

<sup>1</sup> par abus de langage appelé aussi culture d'automne

<sup>2</sup> si pendillards (boues liquides) : on ajoute + 10 %

Types de boues		Coefficients d'équivalence engrais azote minéral efficace (K <sub>eq</sub> N) préconisés par le réseau des MESE d'Occ. : fonction de la culture et de la période d'apport											
		Colza (culture d'hiver <sup>1</sup> )	Cultures d'hiver : Céréales, Oléagineux	Cultures de printemps : Oléagineux (ex : Blé, orge, avoine)	Prairies	Amandier, abricotier, olivier	Viticulture						
		Fin été/ automne	Fin été/ automne	Sortie hiver/ printemps	Fin d'été/ automne avant CIPAN (ex : maïs)	Été/ automne (ex : maïs)	Printemps <sup>2</sup> (ex : sorgho, riz, tournecol)	Automne/ hiver	Printemps	Automne/ hiver	Printemps	Automne/ hiver	Printemps
bandes (C/N = 5,2)													
Boues activées lits de séchage (C/N = 5,4)		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Boues activées lits à rhizophytes (C/N = 5,9) par manque de référence, le réseau des MESE d'Occ. positionne ici les boues issues des LSPR et FPR		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Boues activées déshydratées chauffées (C/N = 5,3)		0,35	0,35	0,15	0,15	0,15	0,35	0,3	0,35	0,3	0,3	0,3	0,3
Boues activées séchées (C/N = 6,0)		0,35	0,2	0,2	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,3	0,3	0,3	0,3
Boues lit bactérien disque biologique liquides (C/N = 7,5)		0,3	0,15	0,15	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Boues lit bactérien déshydratées chauffées (C/N = 5)		0,3	0,15	0,15	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Types de boues		Coefficients d'équivalence engrais azote minéral efficace (Keq N) préconisés par le réseau des MESE d'Occ. : fonction de la culture et de la période d'apport													
		Colza (culture d'hiver)		Cultures d'hiver : Céréales, Oléagineux		Cultures de printemps : Céréales, Oléagineux (ex : Blé, orge, avoine)			Prairies		Amandier, abricotier, olivier		Viticulture		
		Fin été/ automne	Fin été/ automne	Fin été/ hiver/ printemps	Fin d'été/ automne avant CIPAN (ex : maïs)	Été/ automne (ex : maïs)	Printemps <sup>2</sup> (ex : sorgho, riz, tournesol)	Automne/ hiver	Printemps	Automne/ hiver	Printemps	Automne/ hiver	Printemps		
Boues décanteur digesteur (C/N = 8,1)	0,3	0,15	0,15	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
	0,3	0,15	0,15	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
	0,3	0,2	0,25	0,25	0,25	0,3	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
Boues physico- chimiques déshydratées (C/N = 5,5 à 17)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
Boues physico- chimiques déshydratées chaulées (C/N = 10 à 13)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
Boues digérées anaérobies déshydratées (C/N = 5,9)	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
Boues de Perpignan : Boues activées épaissies digérées déshydratées non chaulées (C/N = 5,5)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	



Types de boues	Coefficients d'équivalence engrais azote minéral efficace (K <sub>eq</sub> N) préconisés par le réseau des MESE d'Oc. : fonction de la culture et de la période d'apport													
	Colza (culture d'hiver <sup>1</sup> )	Cultures d'hiver : Céréales, Oléagineux	Cultures de printemps : Oléagineux (ex : Blé, orge, avoine)		Cultures de printemps : Céréales, CIPAN (ex : maïs)		Printemps <sup>2</sup> (ex : sorgho, riz, tourne-sol)		Prairies		Amandier, abricotier, olivier		Viticulture	
	Fin été/ automne	Fin été/ automne	Sortie hiver/ printemps	Fin d'été/ automne avant CIPAN (ex : maïs)	Été/ automne (ex : maïs)	Printemps <sup>2</sup> (ex : sorgho, riz, tourne-sol)	Automne/ hiver	Printemps	Automne/ hiver	Printemps	Automne/ hiver	Printemps	Automne/ hiver	Printemps
Boues digérées anaérobies dshydratées chauffées (C/N = 6,0)	0,3	0,15	0,15	0,2	0,2	0,3	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Boues digérées anaérobies séchées (C/N = 6,1)	0,3	0,15	0,15	0,2	0,2	0,3	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>Composts de boues avec support carboné</b>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Compilation des données issues des sources suivantes : COMIFER (2013); SYPREA (2012) ; GREN Aquitaine (2012) ; GREN Champagne-Ardenne (2013) ; GREN Rhône-Alpes (2012, COMIFER + SYPREA) ; GREN Rhône-Alpes (2014, APCA, CA26 et CA38), GREN Poitou Charentes (2012) ; CRA Pays de Loire (2008) ; groupe APCA-mission boues (2007 non publié), CA66 (2016).

## Annexe 5 : Coefficient d'engrais minéral en phosphore (Keq P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)

Types de boues urbaines ou composts de boues urbaines	Siccité* de la boue étudiée	Traitement	Apport tous les 2 à 3 ans				Apport annuel		
			Année 1			Année 2			
			Keq P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> mini	Keq P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> maxi	Keq P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> retenu par le réseau des MESE d'Occ.				
Boues biologiques	liquides	biologiques	0,72	1	0,86	0,7	0,28	1	
Boues biologiques	pâteuses (20 % MS)	biologiques	0,72	1	0,86	0,7	0,28	1	
Boues biologiques	pâteuses (30 % MS)	biologiques chaulées	0,85			0,85	0,15	1	
Boues biologiques	liquides ou pâteuses	biologiques de déphosphatation chaulées ou traitées aux sels de fer/chaux	0,87	1	0,94	0,9	0,13	1	
Boues biologiques		biologiques traitées aux sels de fer ou aux sels de fer/chaulées	0,83	1	0,92	0,8	0,17	1	
Boues biologiques	liquides ou pâteuses	biologiques digérées	0,41	1	0,71	0,4	0,59	1	
Boues biologiques	solides ou sèches	biologiques digérées conditionnées thermiquement	0,37	0,75	0,56	0,4	0,63	1	
Boues biologiques		biologiques digérées traitées aux sels de fer ou aux sels de fer/chaulées	0,63	0,89	0,76	0,6	0,37	1	
Boues physico-chimiques		physico-chimiques traitées aux sels de fer ou aux sels de fer/chaulées	0,83	0,93	0,88	0,8	0,17	1	
Boues physico-chimiques	pâteuses (30 % MS)	physico-chimiques chaulées	0,85			0,85	0,15	1	
Boues séchées	sèches	séchées	0,85			0,85	0,15	1	
Boues issues des lagunes, lits de séchage plantés de roseaux, filtres plantés de roseaux.	liquides à pâteuses		Préconisations du réseau des MESE d'Occ., en l'absence de références.				0,7	0,3	1
Autres types de boues			Préconisations du réseau des MESE d'Occ., en l'absence de références.				0,7	0,3	1
Composts de boues		compostées avec déchets verts ou sciures de bois	0,55	0,91	0,73	0,55	0,45	1	

Source : travaux synthétisés par C. MOREL à la journée des Missions Déchets des Chambres d'Agriculture (2007)

# Notes

---

A series of horizontal dotted lines for writing notes.





## VOS CONTACTS

### Chambre d'agriculture de l'Aude

Stéphanie Rubio

04 68 11 79 77

[stephanie.rubio@aude.chambagri.fr](mailto:stephanie.rubio@aude.chambagri.fr)

### Chambre d'agriculture du Gard

Claire Gaffier

04 66 25 46 92

[claire.gaffier@gard.chambagri.fr](mailto:claire.gaffier@gard.chambagri.fr)

### Chambre d'agriculture de l'Hérault

Marie Castagnet

04 67 20 88 35

[castagnet@herault.chambagri.fr](mailto:castagnet@herault.chambagri.fr)

### Chambre d'agriculture de la Lozère

Laure Gomita

04 66 65 62 00

[laure.gomita@lozere.chambagri.fr](mailto:laure.gomita@lozere.chambagri.fr)

### Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales

Margot Dalla Nora

04 68 35 85 95

[margot.dallanora@pyrenees-orientales.chambagri.fr](mailto:margot.dallanora@pyrenees-orientales.chambagri.fr)

La réalisation de ce document a été soutenue financièrement par :

